

Ara-C 大量療法[3g/m²/回 (day1,3,5)]

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Ara-C 大量療法

[3g/m²/回 (day1,3,5)]

疾患 白血病

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day3	day5
シタラビン	3000 mg/m ² /回	↓↓	↓↓	↓↓

- 【注意】 * 1 日の尿量が 2000 mL 以上になるように化学療法開始前日より輸液を行う。
 * シタラビンは朝夜 2 回 12 時間ごとに投与する。
 点滴時間は 3 時間を越えないように注意。
 * 治療中はステロイド点眼を行う。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1, 3, 5

- 朝 ① 生食 500mL にて血管確保 維持(20mL/時間)
 ② グラニセトロン注 3mg 1 筒 静注(③の 30 分前)
 ③ シタラビン + 生食 300 mL 点滴静注 180 分
 *生食 200 mL をバッグから前もって抜いておく

- 夜 ④ グラニセトロン注 3mg 1 筒 静注(⑤の 30 分前)
 ⑤ シタラビン + 生食 300 mL 点滴静注 180 分
 *生食 200 mL をバッグから前もって抜いておく

	day 1		day 2		day 3		day 4		day 5	
月日	/				/				/	
シタラビン	↓	↓			↓	↓			↓	↓
開始時間										
確認										