

CA 療法(low-dose Ara-C+ACR)

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

CA(low-dose Ara-C+ACR)療法

疾患名 白血病

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7
キロサイド(シタラビン;Ara-C)	10 mg/m ²	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓
アクラシノン(アクリルビシン;ACR)	14 mg/m ²	↓	↓	↓	↓			
		day8	day9	day10	day11	day12	day13	day14
キロサイド(シタラビン;Ara-C)	10 mg/m ²	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓

【注意】シタラビンは朝夜 2 回 12 時間ごとに皮下注射する。
アクリルビシンは血管外に漏出しないように注意する。

☆通常量より減量する際の理由☆

* G-CSF併用の 有 ・ 無

day 1~4

- 朝
- ① 生食 250mL にて血管確保 維持(20mL/時間)
 - ② キロサイド 皮下注射
 - ③ アクラシノン + 生食 50 mL 点滴静注 5 分(600 mL/時間)
- 夜
- ④ キロサイド 皮下注射

day 5~14

- 朝
- ① キロサイド 皮下注射
- 夜
- ② キロサイド 皮下注射

CA 療法(low-dose Ara-C+ACR)

	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 6	day 7
月日	/	/	/	/	/	/	/
	キロサイド	キロサイド	キロサイド	キロサイド	キロサイド	キロサイド	キロサイド
開始予定時間							
施行者署名							
	アクラシノン	アクラシノン	アクラシノン	アクラシノン			
開始予定時間							
施行者署名							

	day 8	day 9	day 10	day 11	day 12	day 13	day 14
月日	/	/	/	/	/	/	/
	キロサイド	キロサイド	キロサイド	キロサイド	キロサイド	キロサイド	キロサイド
開始予定時間							
施行者署名							