

トリセノックス(As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟


トリセノックス(As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)療法

\_\_\_\_\_ 回/日 \_\_\_\_\_ 回予定

疾患名 急性前骨髄球性白血病(APL)

主治医 \_\_\_\_\_ 指導医 \_\_\_\_\_ HBs 抗原( + - ) HBc 抗体( + - ) HCV 抗体( + - )

スケジュール



- 【注意】 \* 寛解導入療法:骨髄寛解が得られるまで1日1回静脈内投与する。  
 合計の投与回数が 60 回を超えないこと。  
 \* 寛解後療法:1日1回、計 25 回静脈内投与する。  
 \* 投与終了後、点滴セットおよび輸液バッグは所定の運用に則り薬剤部に返却する。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

- ① 生食 500 mL にて血管確保 維持 (20mL/時間)  
 ② トリセノックス + 生食 250 mL 点滴静注 120 分  
 ◎終了後メインの生食ルート内フラッシュして抜針

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
月日	/	/	/	/	/	/
トリセノックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

トリセノックス(As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)療法

	Day7	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12
月日	/	/	/	/	/	/
トリセノックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	Day13	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18
月日	/	/	/	/	/	/
トリセノックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	Day19	Day20	Day21	Day22	Day23	Day24
月日	/	/	/	/	/	/
トリセノックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	Day25	Day26	Day27	Day28	Day29	Day30
月日	/	/	/	/	/	/
トリセノックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	Day31	Day32	Day33	Day34	Day35	Day36
月日	/	/	/	/	/	/
トリセノックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						