

高齢者 APL 地固め療法①

IDR 療法[5mg/m²/day×4 日間]

| | |
|----|----|
| ID | |
| 氏名 | |
| 年齢 | |
| 科名 | 病棟 |

高齢者 APL 地固め療法①

IDR 療法[5mg/m²/day×4 日間]

疾患 急性前骨髄球性白血病

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

| | | | | | |
|----------------|---------------------|-------|---|---|---|
| | | day 1 | 2 | 3 | 4 |
| イダマイシン(イダルビシン) | 5 mg/m ² | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |

【注意】 * 吐気予防のため、デキサメタゾンの投与を検討する。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1~4

- ① 生食 500mL で血管確保
- ② グラニセトロン注 3mg 1筒 側管静注
☆30分後
- ③ イダマイシン + 注射用水 適量 + 生食 100 mL 点滴静注 30分

*イダマイシンは1バイアル(5 mg)を 5mL の注射用水で溶解後、生食 100 mL に混入

| | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | day 1 | day 2 | day 3 | day 4 |
| 月日 | / | / | / | / |
| イダマイシン 開始時刻 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 確認 | | | | |