

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# PETHEMA LPA2005 【中間リスク群】地固め療法② MIT[3日間]+ATRA 療法

疾患 急性前骨髄球性白血病

主治医 \_\_\_\_\_ 指導医 \_\_\_\_\_ HBs 抗原( + - ) HBc 抗体( + - ) HCV 抗体( + - )

## スケジュール

《注射》		day 1	day2	day3
ノバントロン(ミトキサントロン)	10 mg/m <sup>2</sup>	↓	↓	↓
《内服》		day1		day15
ベサノイド(トレチノイン)	45mg/m <sup>2</sup>	↓	.....	↓

【注意】 \* 吐気予防のため、デキサメタゾンの投与を検討する。

☆通常量より減量する際の理由☆

## (レジメン)

### day 1-3

- ① 生食 500mL で血管確保 維持(20mL/時間)
  - ② グラニセトロン注 3mg 1筒 側管静注
  - ☆30分後
  - ③ ノバントロン +生食 100 mL 点滴静注 30分(200 mL/時間)
- ◎終了後メインの生食でルート内フラッシュ

### day 1-15

ベサノイド 内服

	day 1	day 2	day 3
月日	/	/	/
ノバントロン 開始時刻	↓	↓	↓
確認			