

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

PETHEMA LPA2005 【高リスク群】地固め療法② MIT[5日間]+ATRA療法

疾患 急性前骨髄球性白血病

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

《注射》		day 1	day2	day3	day4	day5
ノバントロン(ミトキサントロン)	10 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓

《内服》		day1				day15
ベサノイド(トレチノイン)	45mg/m ²	↓	↓

【注意】 * 吐気予防のため、デキサメタゾンの投与を検討する。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1- 5

- ① 生食 500mL で血管確保 維持(20mL/時間)
- ② グラニセトロン注 3mg 1筒 側管静注
- ☆30分後
- ③ ノバントロン +生食 100 mL 点滴静注 30分(200 mL/時間)
- ◎終了後メインの生食でルート内フラッシュ

day 1- 15

ベサノイド 内服

	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5
月日	/	/	/	/	/
ノバントロン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					