

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

PETHEMA LPA2005

【低リスク群】地固め療法②

MIT[3日間]+ATRA療法

疾患 急性前骨髄球性白血病

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

《注射》		day 1	day2	day3	
ノバントロン(ミトキサントロン)	10 mg/m ²	↓	↓	↓	

《内服》		day1			day15
ベサノイド(トレチノイン)	45 mg/m ²	↓		↓

【注意】 * 吐気予防のため、デキサメタゾンの投与を検討する。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1-3

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② グラニセトロン注 3 mg 1筒 側管静注

☆30分後

- ③ ノバントロン +生食 100 mL 点滴静注 30分(200 mL/時間)

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュ

day 1-15

ベサノイド 内服

PETHEMA LPA2005【低リスク群】地固め療法②
MIT[3日間]+ATRA 療法

	day 1	day 2	day 3
月日	/	/	/
ノバントロン 開始時刻	↓	↓	↓
確認			