

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

JALSG AML201 地固め療法
Ara-C 大量療法
[2g/m²/回 (5日間)]
疾患 白血病

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day2	day3	day4	day5
シタラビン	2000 mg/m ² /回	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓

- 【注意】 * 1日の尿量が2000 mL以上になるように化学療法開始前日より輸液を行う。
 * シタラビンは朝夜2回12時間毎に投与する、点滴時間は3時間を超えないように注意。
 * 必要な場合はNK₁受容体拮抗薬の使用を考慮する。
 * 治療中はステロイド点眼を行う。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1~5

- 朝 ① 生食 500mL にて血管確保 維持(20mL/時間)
 ② グラニセトロン注 3mg 1筒 ③開始の30分前に静注
 ③ シタラビン + 生食 300mL 点滴静注 180分
 *生食 200mL をバッグから前もって抜いておく
- 夜 ④ グラニセトロン注 3mg 1筒 ⑤開始の30分前に静注
 ⑤ シタラビン + 生食 300mL 点滴静注 180分
 *生食 200mL をバッグから前もって抜いておく

	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5
月日	/	/	/	/	/
シタラビン	↓	↓	↓	↓	↓
開始時刻(朝)					
開始時刻(夜)					
確認					