

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

高齢者(70歳以上)
Ph+ALL地固め

4 週毎 6 コース予定

疾患名 急性リンパ性白血病

主治医 指導医 HBs抗原(), HBs抗体(), HBc抗体(), HCV抗体()
スケジュール

【1・3・5コース】		day1	day2	day3	day4	day5	day15 ... 28
《注射》							
メトトレキサート(メトトレキサート)	500 mg/m ²	→					
ロイナーゼ(L-アスパラギナーゼ)	5000 K.U./m ²		↓				
アイソボリン(レボホリナート)	10 mg/body/回		↓	↓↓↓	↓↓↓		
【2・4・6コース】							
シタラビン	500 mg/m ² /回	↓↓		↓↓		↓↓	
【全コース共通】							
《内服》							
スプリセル(ダサチニブ)	100 mg/day						↓ ... ↓

【注意】

- * 1・3コース目はメトトレキサート15 mg・シタラビン40 mg・プレドニゾロン40 mgの髄注を行う。
- * 1日の尿量が3000 mL以上になるように化学療法開始前日より輸液を行う。
- * 補液にメイロンを混注して、尿をアルカリ化(pH≥7.5)する。
- * MTX投与開始後48時間後・72時間後のMTX血中濃度が、それぞれ 1×10^{-6} M($1 \mu\text{mol/L}$)未満, 1×10^{-7} M($0.1 \mu\text{mol/L}$)未満であることを確認し、どちらか一方でも超えた場合は、各々 1×10^{-6} M未満, 1×10^{-7} M未満になるまで、十分な水分補給、尿のアルカリ化、レボホリナートの増量や投与延長を行う。
- * MTXでの治療中はPPI、ペニシリン系抗菌薬、シプロフロキサシン、NSAIDs、ST合剤、レフルノミドの使用は控える。
- * L-アスパラギナーゼ投与時はアナフィラキシーに注意し、初回投与前は皮内テストを行う。
(注射用水で溶解後、一部を生食で希釈し1～10 K.U.を含む溶液を調製する。0.1 mLを皮内に注射し、15～30分間異常がないことを確認する。)
- * シタラビン投与時は1日の尿量が2000 mL以上になるように化学療法開始前日より輸液を行う。
- * シタラビンは朝夜2回12時間ごとに注射する。点滴時間は1時間を越えないように注意。
- * 治療中は、ステロイド点眼を行う。

通常量より減量する際の理由

【1・3・5コース】

day 1

- | | |
|------------------------|--------------|
| ① 生食500 mLにて血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② グラニセトロン 3 mg | 側管静注 |
| ③ メソトレキセート + 生食 500 mL | 持続点滴 24時間 |

day 2

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ① 生食500 mLにて血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② ソル・コーテフ 100 mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ③ ロイナーゼ + 注射用水 適量 | 筋注 |
- * 必ず1バイアル(5000 K.U.)を0.5 mLの注射用水で溶解後、必要量抜き取る
* 初回のロイナーゼ投与前は皮内テストを行うこと

day 2～

- | | |
|----------------|------|
| ① アイソボリン 10 mg | 側管静注 |
|----------------|------|
- アイソボリン25 mgを生食 5 mLで溶解後、必要量 2 mLを採取する。
メソトレキセート投与開始36時間後より開始し、6時間ごとに繰り返し静注する。
48、72時間後に血中MTX濃度を測定する。

day 15～28	スプリセル(ダサチニブ)錠	100 mg	内服
-----------	---------------	--------	----

【2・4・6コース】

day 1, 3, 5

朝

- | | |
|---------------------|--------------|
| ① 生食 500 mLにて血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② グラニセトロン 3 mg | 側管静注 |
| <u>☆30分後より</u> | |
| ③ シタラビン + 生食 100 mL | 点滴静注60分 |

夜

- | | |
|---------------------|---------|
| ① グラニセトロン 3 mg | 側管静注 |
| <u>☆30分後より</u> | |
| ② シタラビン + 生食 100 mL | 点滴静注60分 |

day 15～28 スプリセル(ダサチニブ)錠 100 mg 内服

	1コース			
	day 1	day 2	day3	day4
月 日	/	/	/	/
メトレキセート 開始時刻	↓			
ロイナーゼ 開始時刻		↓		
アイソボリン 開始時刻		↓	↓ ↓ ↓ ↓	↓ ↓
確認			⋮ ⋮ ⋮ ⋮	⋮ ⋮

	2コース			
	day1	day3	day5	
月 日	/	/	/	
シタラビン 開始時刻	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓
確認				

	3コース			
	day 1	day 2	day3	day4
月 日	/	/	/	/
メトレキセート 開始時刻	↓			
ロイナーゼ 開始時刻		↓		
アイソボリン 開始時刻		↓	↓ ↓ ↓ ↓	↓ ↓
確認			⋮ ⋮ ⋮ ⋮	⋮ ⋮

	4コース			
	day1	day3	day5	
月 日	/	/	/	
シタラビン 開始時刻	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓
確認				

	5コース			
	day 1	day 2	day3	day4
月 日	/	/	/	/
メトレキセート 開始時刻	↓			
ロイナーゼ 開始時刻		↓		
アイソボリン 開始時刻		↓	↓ ↓ ↓ ↓	↓ ↓
確認			⋮ ⋮ ⋮ ⋮	⋮ ⋮

	6コース			
	day1	day3	day5	
月 日	/	/	/	
シタラビン 開始時刻	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓
確認				