

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

ビキセオス療法 【地固め】

5～8 週毎 1～2 コース予定

疾患名 急性骨髄性白血病

主治医 指導医 HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

スケジュール

《注射》		day1	day3
ビキセオス(ダウノルビン・シタラビン)	65 U/m ²	↓	↓

【注意】

- * 1コース目:最後の寛解導入療法開始から5～8週後に開始
2コース目:1コース目の地固め療法開始から5～8週後に開始
- * ダウノルビンとしての総投与量は25 mg/kgを超えないこと
(ビキセオス1 U中にダウノルビン/シタラビンとして0.44 mg/1 mg)
- * 点滴ポンプからCVCまたはPICCで投与し、インラインフィルターは使用しないこと
- * 調製後ただちに投与しない場合は2～8℃で保存し、調整後4時間以内に投与開始すること

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

Day 1

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| ① 生食 500 mL にて血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② グラニセトロン 3 mg | 側管静注 |
| ③ アロカリス 235 mg + 生食 100 mL | 点滴静注30分(200 mL/時間) |
| ◎メインの生食でフラッシュ | |
| ④ ビキセオス U + 注射用水 適量 + 生食 500 mL | 点滴静注90分(360 mL/時間) |

Day 3

- ① 生食 500 mL にて血管確保

維持(20 mL/時間)
- ② グラニセトロン 3 mg

側管静注
- ◎メインの生食でフラッシュ
- ③ ビキセオス

U + 注射用水 適量 + 生食 500 mL

点滴静注90分(360 mL/時間)

	1コース目		2コース目	
	day1	day3	day1	day3
月 日	/	/	/	/
ビキセオス 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				