

ID

氏名

年齢

科名

病棟

CHOP 療法

週毎 コース予定

疾患名 悪性リンパ腫

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day2	day3	day4	day5
プレドニン	100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓ day2～内服
ドキシソルビシン	50 mg/m ²	↓				
オンコビン(ピンクリスチン)	1.4 mg/m ² 【最高 2 mg】	↓				
エンドキサン(シクロホスファミド)	750 mg/m ²	↓				

【注意】*ドキシソルビシンの総投与量は 500 mg/m² を超えないこと

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1 抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル(125 mg) 1C 内服

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ① ソリタ T3 200 mL にて血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② パロノセトロン 0.75 mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ③ プレドニン 100 mg + 生食 50 mL | 滴静注 5 分(600 mL/時間) もしくは内服 |
| ④ ドキシソルビシン + 生食 50 mL | 点滴静注 5 分(600 mL/時間) |
| ⑤ オンコビン + 生食 50 mL | 点滴静注 5 分(600 mL/時間) |
| ⑥ エンドキサン + 生食 100 mL | 点滴静注 60 分 |

◎血管確保していたソリタ T3 をエンドキサンと同時滴下 90 分で点滴静注

day 2 - 3 アプレピタントカプセル(80 mg) 1C 1×朝 内服

day 2 - 5 プレドニン 内服

CHOP 療法

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
日 時	/	/	/	/	/	/
プレドニン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドキシソルビシン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓
オンコビン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓
エンドキサン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認						

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
日 時	/	/	/	/	/	/
プレドニン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドキシソルビシン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓
オンコビン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓
エンドキサン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認						