

ID

氏名

年齢

科名

病棟

主治医

指導医

スケジュール

THP-COP療法

週毎 コース予定

疾患名 悪性リンパ腫

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

		day 1	day 2	day 3	day 4	day 5
プレドニン(プレドニゾロン)	60 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓
ピノルビン(ピラルビシン)	50 mg/m ²	↓				
オンコビン(ビンクリスチン)	1.4 mg/m ² 【最高 2 mg】	↓				
エンドキサン(シクロホスファミド)	750 mg/m ²	↓				

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day 1 抗がん薬投与1時間半前にアプレピタントカプセル 125 mg 1Cを内服

- ① ソリタT3 200 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② パロノセトロン0.75 mg + 生食20 mL 側管静注
- ③ プレドニン + 生食50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間)
- ④ ピノルビン + 5%ブドウ糖 50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間)
- ⑤ オンコビン + 生食 50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間)
- ⑥ エンドキサン + 生食 100 mL 点滴静注60分

◎ 血管確保していたソリタT3をエンドキサンと同時滴下90分で点滴静注

day 2 - 3 アプレピタントカプセル 80 mg 1C 1×朝内服

day 2 - 5 プレドニゾロン錠 内服

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月 日	/	/	/	/	/	/
プレドニン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ピノルビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
オンコビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
エンドキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース	コース
月 日	/	/
プレドニン 開始時刻	↓	↓
ピノルビン 開始時刻	↓	↓
オンコビン 開始時刻	↓	↓
エンドキサン 開始時刻	↓	↓
確認		