

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

THP-COP 療法

週毎 コース予定

疾患名 悪性リンパ腫

主治医 指導医 HBs 抗原() HBs 抗体() HBc 抗体() HCV 抗体()

スケジュール

		day1	2	3	4	5
プレドニン(プレドニゾロン)	60 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓
ピノルビン(ピラルビシン)	50 mg/m ²	↓				
オンコビン(ピンクリスチン)	1.4 mg/m ² 【最高 2 mg】	↓				
エンドキサン(シクロホスファミド)	750 mg/m ²	↓				

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1 抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル(125 mg) 1C 内服

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ① ソリタ T3 200 mL にて血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② パロノセトロン 0.75 mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ③ プレドニン + 生食 50 mL | 点滴静注 5 分(600 mL/時間) |
| ④ ピノルビン + 5%ブドウ糖 50 mL | 点滴静注 5 分(600 mL/時間) |
| ⑤ オンコビン + 生食 50 mL | 点滴静注 5 分(600 mL/時間) |
| ⑥ エンドキサン + 生食 100 mL | 点滴 60 分 |

◎血管確保していたソリタ T3 をエンドキサンと同時滴下 90 分で点滴静注

day 2 - 3 アプレピタントカプセル(80 mg) 1C 1×朝 内服

day 2 - 5 プレドニン 内服

THP-COP 療法

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
プレドニン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ピノルビン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
オンコビン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
エンドキサン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								