

Hyper-CVAD 療法

ID
氏名
年齢
科名
病棟

Hyper-CVAD 療法

疾患 悪性リンパ腫

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day2	day3	day4
エンドキサン(シクロホスファミド)	300 mg/m ² /回	↓↓	↓↓	↓↓	
オンコビン(ビンクリスチン)	2 mg/body				↓
ドキシソルビシン	50 mg/m ²				↓
デキサメタゾン注	33 mg/body	↓	↓	↓	↓
		Day11	day12	day13	day14
オンコビン(ビンクリスチン)	2 mg/body	↓			
デキサメタゾン注	33 mg/body	↓	↓	↓	↓

【注意】 * 1日の尿量が 3000 mL 以上になるように化学療法開始前日より輸液を行う。

* シクロホスファミドは朝夜 2 回 12 時間ごとに注射する。

* ドキシソルビシンの総投与量は 500mg/m² を超えないこと。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1 抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル(125 mg) 1C 内服

朝 ① 生食 500mL	にて血管確保	維持(20mL/時間)
② グラニセトロン注 3mg 1 筒+	生食 100 mL	点滴静注 30 分(③の 30 分前)
③ エンドキサン	+ 生食 500 mL	点滴静注 180 分
④ デキサメタゾン注 33mg (10 mL) +	生食 100 mL	点滴静注 60 分
夜 ⑤ グラニセトロン注 3mg 1 筒+	生食 100 mL	点滴静注 30 分(⑥の 30 分前)
⑥ エンドキサン	+ 生食 500 mL	点滴静注 180 分

Hyper-CVAD 療法

day 2-3

- 朝 ① 生食 500mL にて血管確保 維持(20mL/時間)
② グラニセトロン注 3mg 1筒+ 生食 100 mL 点滴静注 30分(③の30分前)
③ エンドキサン + 生食 500 mL 点滴静注 180分
④ デキサメタゾン注 33mg (10 mL) + 生食 100 mL 点滴静注 60分
- 夜 ⑤ グラニセトロン注 3mg 1筒+ 生食 100 mL 点滴静注 30分(⑥の30分前)
⑥ エンドキサン + 生食 500 mL 点滴静注 180分

day 4

- ① 生食 500mL にて血管確保 維持(20mL/時間)
② グラニセトロン注 3mg 1筒+ 生食 100 mL 点滴静注 30分(③の30分前)
③ ドキソルビシン + 生食 50 mL 点滴静注 5分(600mL/時間)
④ オンコビン 2 mg + 生食 50 mL 点滴静注 5分(600mL/時間)
⑤ デキサメタゾン注 33mg (10 mL)+ 生食 100 mL 点滴静注 60分(100 mL/時間)

day 2 - 5 アプレピタントカプセル(80 mg) 1C 1×朝 内服

day 11

- ① 生食 250mL にて血管確保 維持(20mL/時間)
② オンコビン 2mg + 生食 50 mL 点滴静注 5分(600mL/時間)
③ デキサメタゾン注 33mg (10 mL)+ 生食 100 mL 点滴静注 60分(100 mL/時間)

day 12-14

- ① 生食 250mL にて血管確保 維持(20mL/時間)
② デキサメタゾン注 33mg (10 mL)+ 生食 100 mL 点滴静注 60分(100 mL/時間)
(内服への変更可:デキサメタゾン錠 40 mg)

Hyper-CVAD 療法

	day 1		day 2		day 3		day 4		day 11	day 12	day 13	day 14
月日	/		/		/		/		/	/	/	/
	エンドキサン		エンドキサン		エンドキサン							
開始予定時間	朝	夜	朝	夜	朝	夜						
施行者署名												
	デキサメタゾン		デキサメタゾン		デキサメタゾン		デキサメタゾン		デキサメタゾン	デキサメタゾン	デキサメタゾン	デキサメタゾン
開始予定時間												
施行者署名												
							ドキソルビシン					
開始予定時間												
施行者署名												
							オンコピン	オンコピン				
開始予定時間												
施行者署名												