Bendamustine療法 ID Bendamustine療法 氏名 3 週毎 コース予定 年齢 疾患名 悪性リンパ腫 科名 病棟 指導医 HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体() 主治医 スケジュール day1 day2 1 ベンダムスチン 120 mg/m^2 * ベンダムスチンは調製後6時間以内に投与を終了すること。 * ニューモシスチス肺炎予防としてST合剤の投与を検討すること。 ☆通常量より減量する際の理由☆ (レジメン) day 1 生食 500 mL にて血管確保 **1** 維持(20mL/時間) **(2**) パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 9.9 mg + 生食 20 mL 側管静注 ③ ベンダムスチン + 生食 50 mL 点滴静注10分 ◎ 血管確保していた生食をベンダムスチンと同時滴下 **(4**) 生食 200 mLを点滴し、残りは破棄 day 2 生食 500 mL にて血管確保 維持(20mL/時間) **1 2** デキサメタゾン 9.9 mg + 生食 20 mL 側管静注 ③ ベンダムスチン 点滴静注10分 + 生食 50 mL ◎ 血管確保していた生食をベンダムスチンと同時滴下

day 3, 4 デキサメタゾン錠 8 mg 2× 朝昼 内服

生食 200 mLを点滴し、残りは破棄

(4)

			_ 7		_ 7		
	コース		コース		コース		
	day1	day2	day1	day2	day1	day2	
月日	/	/	/	/	/	/	
ベンダムスチン	Ţ	Ţ	↓	↓	↓	Ţ	
開始時刻							
確認							
	コース		コース		コース		
	day1	day2	day1	day2	day1	day2	
月日	/	/	/	/	/	/	
ベンダムスチン	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Í.	Ĺ	
開始時刻	•	•	•	*	Ť	•	
確認							
7年100							
	コース コース コース					-7	
	day1	day2	day1	day2	day1	day2	
月 日 ベンダムスチン	/ I	/	<u>/</u>	/	/	<u>/</u>	
-	1	↓	↓ ↓	↓		↓	
開始時刻							
確認							
	コース		コース		コース		
	day1	day2	day1	day2	day1	day2	
月日	/	/	/	/	/	/	
ベンダムスチン	Ţ	↓	↓	↓	↓	↓	
開始時刻							
確認							
	コース		コース		コース		
	day1	day2	day1	day2	day1	day2	
月日	/	/	/	/	/	/	
ベンダムスチン	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	
開始時刻	•	•	•	•	•	•	
確認							
H庄 DC/				<u> </u>			
Г	コース		コース		コース		
	day1	day2	day1	day2	day1	day2	
月日	uay 1 /	uay2 /	/ uay i	uay2 	иау I /	/ /	
ベンダムスチン	/ 	/	<u>'</u>	 '	/	/ 	
ハンダムステン 開始時刻	V	1	. ↓	*			
				<u> </u>			
確認							
				コース		コース	
		-ス					
	day1	day2	day1	day2	day1	day2	
月日	/	/	/	/	/	/	
ベンダムスチン 開始時刻	ţ	↓	↓	1	↓	Ţ	
確認							
				1			