

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

モガムリズマブ療法

1週毎 8コース予定

疾患名 成人T細胞白血病リンパ腫(ATL)[CCR4陽性]

主治医 _____ 指導医 _____ HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

スケジュール

		day 1
ポテリジオ(モガムリズマブ)	1 mg/kg	↓

【注意】

- * 初回投与時はInfusion reaction予防のため、ヒドロコルチゾン100 mgの静脈注射を施行し、2回目以降は必要に応じて使用する。
- * 初回治療時など総腫瘍量が多い場合、腫瘍崩壊症候群予防のために1日3000 mL以上の尿量を確保する。
- * ニューモシスチス肺炎予防のため、バクタ(ST合剤) 1T 1× 内服投与する。
- * 前投薬として、レスタミンコーワ錠(10 mg)3~5錠 およびカロナール錠(500 mg)1~2錠内服投与する。

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

【初回投与】

day 1

- | | |
|------------------------|--------------|
| ① 生食 500 mLで血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② ハイドロコートン 100 mg | 側管静注 |
| レスタミン錠 10 mg (_____)錠 | 内服 |
| カロナール錠 500 mg (_____)錠 | 内服 |

☆30分後より

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------------|
| ③ ポテリジオ ・ | + | 生食 200 mL | 側管静注120分(100 mL/時間) |
|-----------|---|-----------|---------------------|

* 生食 50 mLをバックから前もって抜いておく

◎ 終了後、血管確保用生食を全開にして、35 mL以上をフラッシュする

モガムリズムマブ療法

【2回目以降】

day 1

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
 - ② ハイドロコトシ 100 mg 側管静注
 レスタミン錠 10 mg ()錠 内服
 カロナール錠 500 mg ()錠 内服
 - ☆30分後より
 - ③ ポテリジオ + 生食 200 mL 側管静注120分(100 mL/時間)
- *生食 50 mLをバックから前もって抜いておく
- ◎ 終了後、血管確保用生食を全開にして、35 mL以上をフラッシュする

	1コース	2コース	3コース	4コース	5コース
月日	/	/	/	/	/
ポテリジオ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	6コース	7コース	8コース
月日	/	/	/
ポテリジオ 開始時刻	↓	↓	↓
確認			