

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

モガムリズマブ療法

1週毎 8 コース予定

疾患名

成人T細胞白血病リンパ腫 (ATL) 【CCR4 陽性】

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

ポテリジオ(モガムリズマブ) 1 mg/kg	day1 ↓
------------------------	-----------

【注意】

- * 初回投与時は Infusion reaction 予防のため、ヒドロコルチゾン 100 mg の静脈注射を施行し、2 回目以降は必要に応じて使用する。
- * 初回治療時など総腫瘍量が多い場合、腫瘍崩壊症候群予防のために1日 3000 mL 以上の尿量を確保する。
- * ニューモシスチス肺炎予防のため、バクタ(ST 合剤) 1T 1× 内服投与する。
- * 前投薬として、レスタミンコーワ錠(10 mg)3~5 錠 およびカロナール錠(200 mg)2~3 錠内服投与する。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

【初回投与】

day1

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保 | 維持 (20 mL/時間) |
| ② ハイドロコートン注 100 mg/V | 側管静注 |
| レスタミン錠 (10 mg) (_____)錠 | 内服 |
| カロナール錠 (200 mg) (_____)錠 | 内服 |

☆30 分後より

- ③ ポテリジオ + 生食 200 mL 側管静注 120 分(100 mL/時間)

* 生食 50mL をバックから前もって抜いておく

◎ 終了後、血管確保用生食を全開にして、35 mL 以上をフラッシュする

モガムリズマブ療法

【2回目以降】

day1

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持 (20 mL/時間)
- ② ハイドロコートン注 100 mg/V 側管静注 (省略可;省略する場合は赤線で消す)
- レスタミン錠 (10 mg) ()錠 内服
- カロナール錠 (200 mg) ()錠 内服

☆30分後より

- ③ ポテリジオ +生食 200mL 側管静注 120分(100 mL/時間)

*生食 50mL をバックから前もって抜いておく

◎ 終了後、血管確保用生食を全開にして、35mL 以上をフラッシュする

	1コース	2コース	3コース	4コース	5コース	6コース	7コース	8コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ポテリジオ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								