

エトポシド大量療法(500mg /m²)

ID
氏名
年齢
科名
病棟

エトポシド大量療法(500mg /m²)

疾患名 悪性リンパ腫

(自己末梢血幹細胞採取前治療)

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)
スケジュール

		day1	day2	day3
エトポシド	500 mg/m ²	↓	↓	↓

【注意】 * エトポシドは原液をシリンジに充填し、病棟で混和調製する。
 エトポシドは溶解後結晶が析出するため、半分量ずつ調製する。
 まず 1 日投与量の半分のエトポシドをソルデム 3A 500mL に混和して 120 分で点滴。
 点滴が終了した後に残りの半分量をソルデム 3A 500mL に混和して 120 分で点滴する。
 DEHP フリー点滴セット(フィルターなし)を使用する。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1~3

- ① 生食 500 mL にて血管確保 維持(20mL/時間)
- ② グラニセトロン内服ゼリー (2mg) 1 包 内服
- ③ デキサメタゾン注 6.6mg(2mL) + 生食 20 mL 側管静注
- ④ エトポシド 1/2 量 + ソルデム 3A 500 mL 点滴静注 120 分 (250 mL/時間)
- ⑤ エトポシド 1/2 量 + ソルデム 3A 500 mL 点滴静注 120 分 (250 mL/時間)

◎ 終了後、メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	day1	day2	day3
月日	/	/	/
エトポシド 開始時刻(1 回目)	↓	↓	↓
開始時刻(2 回目)			
確認			