

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

GEM+CDDP+DEX 療法

3 週毎 _____ コース予定

疾患名 悪性リンパ腫

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	2	3	4	8
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	↓				↓
シスプラチン	75 mg/m ²	↓				
デキサメタゾン	注射 33 mg・内服 40 mg /body	↓	↓	↓	↓	

【注意】 * 一日の尿量が 3000mL 以上になるように化学療法前日より輸液を行う。

* シスプラチンは遮光のこと

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1 抗がん剤投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル(125mg)1C を内服

- ① 生食 500mL にて血管確保 維持 (20mL/時間)
- ② ソルデム3A 500mL 点滴静注 120 分 (250mL/時間)
- ③ グラニセトロン注 3mg 1 筒 側管静注
- ④ デキサメタゾン注 33 mg (10 mL) + 生食 100mL 点滴静注 30 分 (200mL/時間)
- ⑤ ゲムシタビン + 生食 100mL 点滴静注 30 分 (200mL/時間)
- ⑥ シスプラチン + 生食 300mL 点滴静注 120 分 (240mL/時間)

* 生食 200mL をバックから前もって抜いておく

- ⑦ 20%マンニトール 200mL 点滴静注 30 分 (400mL/時間)
- ⑧ ソルデム3A 500mL 点滴静注 240 分 (125mL/時間)
- ⑨ ソルデム3A 500mL 点滴静注 240 分 (125mL/時間)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

◎

day2, 3 アプレピタントカプセル(80mg) 1C 内服

day2- 4 デキサメタゾン錠 40 mg 内服

day 8

- ① 生食 500mL にて血管確保 維持 (20mL/時間)
- ② デキサメタゾン注 6.6mg (2 mL) + 生食 20 mL 側管静注
- ③ ゲムシタビン + 生食 100mL 点滴静注 30分 (200mL/時間)
- ◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

	コース		コース	
	day 1	day 8	day 1	day 8
月日	/	/	/	/
デキサメタゾン 開始時刻	↓		↓	
ゲムシタビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時刻	↓		↓	
確認				

	コース		コース	
	day 1	day 8	day 1	day 8
月日	/	/	/	/
デキサメタゾン 開始時刻	↓		↓	
ゲムシタビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時刻	↓		↓	
確認				

	コース		コース	
	day 1	day 8	day 1	day 8
月日	/	/	/	/
デキサメタゾン 開始時刻	↓		↓	
ゲムシタビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時刻	↓		↓	
確認				