

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Brentuximab - MMAE 療法

3 週毎 コース予定

疾患名 悪性リンパ腫【CD30 陽性】

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day 1
アドセトリス(ブレンツキシマブ ベドチン)	1.8mg/kg	↓

【注意】 *体重が 100kg 超える場合は 100 kgとして投与量を計算すること

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

- ① 生食 500mL にて血管確保 維持(20mL/時間)
- ② デキサメタゾン注 6.6mg (2 mL) + 生食 20mL 側管静注
- ③ アドセトリス + 注射用水 適量 + 生食 適量(全量 100 mL) 点滴静注 30 分
 * 1 バイアルあたり注射用水 10.5mL で溶解し(5 mg/mL)、必要量を抜き取る。
(投与量が 120mg を超える場合は生食 250mL(点滴時間 60 分)、40 mgを下回る場合は生食 50mL に修正する)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/
アドセトリス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/
アドセトリス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							