

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# E-COP[day2]+ 【BS】Rituximab療法

週毎 コース予定

疾患名 悪性リンパ腫

主治医 指導医 HBs抗原( )、HBs抗体( )、HBc抗体( )、HCV抗体( )  
スケジュール

		day1	day2	day3	day4	day5	day6
リツキシマブ BS	375 mg/m <sup>2</sup>	↓					
プレドニン(プレドニゾロン)	100 mg/body		↓	↓	↓	↓	↓
オンコビン(ビンクリスチン)	1.4 mg/m <sup>2</sup> 【最高 2mg】		↓				
エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>		↓	↓	↓		
エンドキサン(シクロホスファミド)	750 mg/m <sup>2</sup>		↓				

【注意】 \* リツキシマブ施行時は体温・脈拍・血圧測定・SpO2測定はup直前におこなうこと

\* エトポシドは溶解後結晶が析出するため用時100 mgを輸液250 mL以上で溶解し、  
(濃度0.4 mg/mL以下の濃度になるように)30～60分で点滴静注するのが望ましい。  
また、DEHPフリー点滴セット(フィルターなし)を使用する。

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

【初回のみ】 \* 初回投与は必ず入院で実施

day1

① イブプロフェン (100 mg) 錠、デザレックス (5 mg) 錠 内服

☆30分後より

② 生食500 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)

③ リツキシマブ BS + 生食 適量(10倍希釈)

◎ 輸液ポンプにて 50 mL/時間 で点滴静注

\*注:総量600 mLを超える時はテルモ生食1Lを使用

- ④ 50 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
  - ◎ 輸液ポンプにて 100 mL/時間 で点滴静注
- ⑤ 100 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
  - ◎ 輸液ポンプにて 150 mL/時間 で点滴静注
- ⑥ 150 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
  - ◎ 輸液ポンプにて 200 mL/時間 で点滴静注
- ⑦ 200 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
  - ◎ 輸液ポンプにて 250 mL/時間 で点滴静注
- ⑧ 250 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
  - ◎ 輸液ポンプにて 300 mL/時間 で点滴静注
- ⑨ 300 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
  - ◎ 輸液ポンプにて 350 mL/時間 で点滴静注
- ⑩ 350 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
  - ◎ 輸液ポンプにて 400 mL/時間 で点滴静注

【2回目以降】 第1サイクルにおいて発現した有害事象がGrade 2以下であった場合

day1

- ① イブuproフェン (100 mg) \_\_\_\_\_錠、デザレックス (5 mg) \_\_\_\_\_錠 内服  
☆30分後より
- ② 生食500 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ③ リツキシマブ BS + 生食 適量(10倍希釈)
  - ◎ 輸液ポンプにて 100 mL/時間 で点滴静注
  - \*注:総量600 mLを超える時はテルモ生食1 Lを使用
- ④ 100 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
  - ◎ 輸液ポンプにて 200 mL/時間 で点滴静注
- ⑤ 200 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
  - ◎ 輸液ポンプにて 300 mL/時間 で点滴静注
- ⑥ 300 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
  - ◎ 輸液ポンプにて 400 mL/時間 で点滴静注

day 2

- ① グラニセトロン内服ゼリー (2 mg) 1 包 内服
- ② ソルデム 1 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
- ③ プレドニン + 生食 50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間)
- ④ オンコビン + 生食 50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間)
- ⑤ エトポシド + 5%ブドウ糖液 500 mL 点滴静注90分(350 mL/時間)
- ⑥ エンドキサン + 生食 100 mL 点滴静注60分(100 mL/時間)

◎血管確保していたソルデム 1 をエンドキサンと同時滴下90 分で点滴静注

day 3, 4

- ① 生食500 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② プレドニン + 生食 50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間)
- ③ エトポシド + 5%ブドウ糖液 500 mL 点滴静注90分 (350 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内をフラッシュして抜針

day 5, 6

- ① プレドニン + 生食50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間)

	コース					
	day1	day2	day3	day4	day5	day6
月 日	/	/	/	/	/	/
リツキシマブ BS 開始時刻	↓					
プレドニン 開始時刻		↓	↓	↓	↓	↓
オンコビン 開始時刻		↓				
エトポシド 開始時刻		↓	↓	↓		
エンドキサン 開始時刻		↓				
確認						