

CHOP[day1]+【BS】Rituximab 療法【同日】

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

CHOP [day1] + 【BS】 Rituximab 療法【同日】

週毎 コース予定

疾患名 悪性リンパ腫

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day2	day3	day4	day5
リツキシマブ BS	375 mg/m ²	↓				
プレドニン	100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓ day 2 からは内服
ドキシソルビシン	50 mg/m ²	↓				
オンコピン(ピンクリスチン)	1.4 mg/m ² 【最高 2mg】	↓				
エンドキサン(シクロホスファミド)	750 mg/m ²	↓				

【注意】 * リツキシマブ施行時は体温・脈拍・血圧測定・SpO2 測定は up 直前におこなうこと

* ドキシソルビシンの総投与量は 500mg/m² を超えないこと

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

【初回のみ】 *初回投与は必ず入院で実施

day1 抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル(125 mg) 1C 内服

① イブプロフェン(100 mg) 錠 デザレックス(5 mg) 錠 内服

☆30 分後より

② 生食 500 mL にて血管確保 維持(20 mL/時間)

③ リツキシマブ BS + 生食 適量(10 倍希釈)

◎ 輸液ポンプにて 50 mL/時間で点滴静注

*注:総量 600 mL を超える時はテルモ生食1L を使用

④ 50 mL/時間で 30 分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 100 mL/時間で点滴静注

CHOP[day1]+【BS】Rituximab 療法【同日】

⑤ 100 mL/時間で 30 分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 150 mL/時間で点滴静注

⑥ 150 mL/時間で 30 分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 200 mL/時間で点滴静注

⑦ 200 mL/時間で 30 分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 250 mL/時間で点滴静注

⑧ 250 mL/時間で 30 分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 300 mL/時間で点滴静注

⑨ 300 mL/時間で 30 分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 350 mL/時間で点滴静注

⑩ 350 mL/時間で 30 分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 400 mL/時間で点滴静注

⑪ パロノセトロン 0.75 mg + 生食 20 mL

側管静注

⑫ プレドニン 100 mg + 生食 50 mL

点滴静注 5 分(600 mL/時間)もしくは内服

⑬ ドキソルビシン + 生食 50 mL

点滴静注 5 分(600 mL/時間)

⑭ オンコビン + 生食 50 mL

点滴静注 5 分(600 mL/時間)

⑮ エンドキサン + 生食 100 mL

点滴静注 60 分

◎ 血管確保していた生食をエンドキサンと同時滴下 90 分で点滴静注

day 2 - 3 アプレピタントカプセル(80 mg) 1C 1×朝 内服

day 2 - 5 プレドニン 内服

CHOP[day1]+【BS】Rituximab 療法【同日】

【2 回目以降】 第1サイクルにおいて発現した有害事象が Grade 2 以下であった場合

day 1 抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル(125 mg) 1C 内服

① イブプロフェン(100 mg) _____ 錠 デザレックス(5 mg) _____ 錠 内服

☆30 分後より

② 生食 500 mL にて血管確保 _____ 維持(20 mL/時間)

③ リツキシマブ BS _____ + 生食 適量(10 倍希釈)

◎ 輸液ポンプにて 100 mL/時間で点滴静注

*注:総量 600 mL を超える時はテルモ生食1L を使用

④ 100 mL/時間で 30 分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 200 mL/時間で点滴静注

⑤ 200 mL/時間で 30 分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 300 mL/時間で点滴静注

⑥ 300 mL/時間で 30 分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 400 mL/時間で点滴静注

⑦ パロノセトロン 0.75 mg + 生食 20 mL _____ 側管静注

⑧ プレドニン 100 mg + 生食 50 mL _____ 点滴静注 5 分(600 mL/時間)もしくは内服

⑨ ドキソルビシン _____ + 生食 50 mL _____ 点滴静注 5 分(600 mL/時間)

⑩ オンコビン _____ + 生食 50 mL _____ 点滴静注 5 分(600 mL/時間)

⑪ エンドキサン _____ + 生食 100 mL _____ 点滴静注 60 分

◎ 血管確保していた生食をエンドキサンと同時滴下 90 分で点滴静注

day 2 - 3 アプレピタントカプセル(80 mg) 1C 1×朝 内服

day 2 - 5 プレドニン 内服

CHOP[day1]+【BS】Rituximab 療法【同日】

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
	/	/	/	/	/	/	/	/
リツキシマブ BS 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
プレドニン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドキシソルビシン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
オンコピン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
エンドキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								