

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Bendamustine[day1,2]+ 【BS】Rituximab療法【同日】

4 週毎 コース予定

疾患名 悪性リンパ腫

主治医 指導医 HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

		day1	day2
リツキシマブ BS	375 mg/m ²	↓	
ベンダムスチン	90 mg/m ²	↓	↓

- 【注意】 * リツキシマブ投与時は、体温・脈拍・血圧測定・SpO2測定を投与速度up直前におこなうこと。
* ベンダムスチンは調製後6時間以内に投与を終了すること。
* ニューモシスチス肺炎予防としてST合剤の投与を検討すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1

【初回のみ】 * 初回投与は必ず入院で実施

① イブuproフェン(100 mg)錠 デザレックス(5 mg)錠 内服

☆30分後より

② 生食 500 mL にて血管確保 維持(20 mL/時間)

③ リツキシマブ BS + 生食 適量 (10倍希釈)

◎ 輸液ポンプにて 50 mL/時間 で点滴静注

*注:総量 600 mLを超える時はテルモ生食1 Lを使用

④ 50 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 100 mL/時間 で点滴静注

⑤ 100 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 150 mL/時間 で点滴静注

⑥ 150 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 200 mL/時間 で点滴静注

⑦ 200 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 250 mL/時間 で点滴静注

Bendamustine [day1,2]+【BS】Rituximab療法【同日】

- ⑧ 250 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
 - ◎ 輸液ポンプにて 300 mL/時間 で点滴静注
- ⑨ 300 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
 - ◎ 輸液ポンプにて 350 mL/時間 で点滴静注
- ⑩ 350 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
 - ◎ 輸液ポンプにて 400 mL/時間 で点滴静注
- ⑪ パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 9.9 mg + 生食 20 mL 側管静注
- ⑫ ベンダムスチン + 生食 50 mL 点滴静注10分
 - ◎ 血管確保していた生食をベンダムスチンと同時滴下
- ⑬ 生食 200 mLを点滴し、残りは破棄

day 2

- ① 生食 500 mL にて血管確保 維持(20mL/時間)
- ② デキサメタゾン 9.9 mg + 生食 20 mL 側管静注
- ③ ベンダムスチン + 生食 50 mL 点滴静注10分
 - ◎ 血管確保していた生食をベンダムスチンと同時滴下
- ④ 生食 200 mLを点滴し、残りは破棄

day 3, 4 デキサメタゾン錠 8 mg 2× 朝昼 内服

【2回目以降】 第1サイクルにおいて発現した有害事象がGrade 2以下であった場合

day 1

- ① イブuproフェン(100 mg) _____ 錠 デザレックス(5 mg) _____ 錠 内服
 - ☆30分後より
- ② 生食 500 mL にて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ③ リツキシマブ BS + 生食 適量 (10倍希釈)
 - ◎ 輸液ポンプにて 100 mL/時間 で点滴静注
 - *注:総量 600 mLを超える時はテルモ生食1Lを使用

Bendamustine [day1,2]+【BS】Rituximab療法【同日】

- ④ 100 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
 - ◎ 輸液ポンプにて 200 mL/時間 で点滴静注
- ⑤ 200 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
 - ◎ 輸液ポンプにて 300 mL/時間 で点滴静注
- ⑥ 300 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
 - ◎ 輸液ポンプにて 400 mL/時間 で点滴静注
- ⑦ パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 9.9 mg + 生食 20 mL 側管静注
- ⑨ ベンダムスチン + 生食 50 mL 点滴静注10分
 - ◎ 血管確保していた生食をベンダムスチンと同時滴下
- ⑩ 生食 200 mLを点滴し、残りは破棄

day 2

- ① 生食 500 mL にて血管確保 維持(20mL/時間)
- ② デキサメタゾン 9.9 mg + 生食 20 mL 側管静注
- ③ ベンダムスチン + 生食 50 mL 点滴静注10分
 - ◎ 血管確保していた生食をトリアキシンと同時滴下
- ④ 生食 200 mLを点滴し、残りは破棄

day 3, 4

デキサメタゾン錠 8 mg 2× 朝昼 内服

	コース		コース		コース	
	day1	day2	day1	day2	day1	day2
月日	/	/	/	/	/	/
リツキシマブBS 開始時刻	↓		↓		↓	
ベンダムスチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース		コース		コース	
	day1	day2	day1	day2	day1	day2
月日	/	/	/	/	/	/
リツキシマブBS 開始時刻	↓		↓		↓	
ベンダムスチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						