

| | |
|----|----|
| ID | |
| 氏名 | |
| 年齢 | |
| 科名 | 病棟 |

ブスルファン+チオテパ療法 (自己末梢血幹細胞移植)

疾患名 悪性リンパ腫

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)
スケジュール

| | | day-8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | day0 |
|-----------------|-----------|-------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| ブスルフェクス(ブスルファン) | 3.2 mg/kg | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | |
| リサイオ(チオテパ) | 5 mg/kg | | | | | ↓ | ↓ | | | |
| 自己末梢血幹細胞の輸注 | | | | | | | | | | ↓ |

- 【注意】 * ブスルファンは中心静脈からポンプを用いて3時間かけて投与し、調製後8時間以内に投与を終了すること
- * 痙攣予防としてレベチラセタム(イーケプラ)の投与を考慮すること
- * ブスルファンは肥満患者(BMIが25以上)においては、標準体重から換算した用量を考慮すること
- * チオテパは0.2 μmのインラインフィルターを通して投与すること

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day -8~-5

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② グラニセトロン注 3 mg 1筒 | 側管静注 |
| ③ デキサメタゾン注 9.9 mg(3 mL) + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ④ ブスルフェクス + 生食 適量(11倍希釈) | 点滴静注 180分 |

day -4~-3

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② グラニセトロン注 3 mg 1筒 | 側管静注 |
| ③ デキサメタゾン注 9.9 mg(3 mL) + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ④ リサイオ + 生食 250 mL | 点滴静注 120分(125 mL/時間) |

ブスルファン+チオテパ療法(自己末梢血幹細胞移植)

day -2~-1

① デキサメタゾン注 6.6 mg(2 mL) + 生食 20 mL

側管静注

day 0

① 生食 500 mL にて血管確保

維持(20 mL/時間)

② ハイドロコトシ 100 mg + 生食 20 mL

側管静注

③ レスカルミン注 1A

側管静注

④ 末梢血幹細胞輸注

| | day-8 | day-7 | day-6 | day-5 | day-4 | day-3 | day-2 | day-1 | day0 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 月 日 | / | / | / | / | / | / | | | / |
| ブスルフェクス 開始時刻 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | |
| リサイオ 開始時刻 | | | | | ↓ | ↓ | | | |
| 末梢血幹細胞輸注 開始時刻 | | | | | | | | | ↓ |
| 確 認 | | | | | | | | | |