

ID

氏名

年齢

科名

病棟

A-CHP 療法

3週毎 コース予定(最大8コース)

疾患名 CD30 陽性末梢性 T 細胞リンパ腫

主治医

指導医

HBs 抗原() HBs 抗体() HBc 抗体() HCV 抗体()

スケジュール

		day1	day2	day3	day4	day5
プレドニン(プレドニゾロン)	100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓
ドキシソルビシン	50 mg/m ²	↓				
エンドキサン(シクロホスファミド)	750 mg/m ²	↓				
アドセトリス(ブレンツキシマブ ベドチン)	1.8 mg/kg	↓				

【注意】*ドキシソルビシンの総投与量は 500 mg/m² を超えないこと

*体重が 100 kg を超える場合は、100 kg としてアドセトリスの投与量を計算すること

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day 1 抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル 125 mg 1C 内服

- ① 生食 500 mL にて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② パロノセトロン 0.75 mg + 生食 20 mL 側管静注
- ③ プレドニン 100 mg + 生食 50 mL 点滴静注 5 分(600 mL/時間)または内服
- ④ ドキシソルビシン + 生食 50 mL 点滴静注 5 分(600 mL/時間)
- ⑤ エンドキサン + 生食 100 mL 点滴静注 60 分
- ⑥ アドセトリス + 注射用水 適量 + 生食 適量(全量 100 mL) 点滴静注 30 分

*1 バイアルあたり注射用水 10.5 mL で溶解し(5 mg/mL)、必要量を抜き取る

投与量が 120 mg を超える場合は生食 250 mL、40 mg 未満の場合は生食 50 mL に修正

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュして抜針

day 2 - 3 アプレピタントカプセル 80 mg 1C 1×朝 内服

	コース	コース	コース	コース
日 時	/	/	/	/
プレドニン 開始時間	↓	↓	↓	↓
ドキシソルビシン 開始時間	↓	↓	↓	↓
エンドキサン 開始時間	↓	↓	↓	↓
アドセトリス 開始時間	↓	↓	↓	↓

	コース	コース	コース	コース
日 時	/	/	/	/
プレドニン 開始時間	↓	↓	↓	↓
ドキシソルビシン 開始時間	↓	↓	↓	↓
エンドキサン 開始時間	↓	↓	↓	↓
アドセトリス 開始時間	↓	↓	↓	↓

	コース	コース	コース	コース
日 時	/	/	/	/
プレドニン 開始時間	↓	↓	↓	↓
ドキシソルビシン 開始時間	↓	↓	↓	↓
エンドキサン 開始時間	↓	↓	↓	↓
アドセトリス 開始時間	↓	↓	↓	↓