

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

デニロイキン ジフチトクス療法

3 週毎 コース予定

疾患名 末梢性/皮膚 T 細胞リンパ腫

主治医 指導医 HBs 抗原() HBs 抗体() HBc 抗体() HCV 抗体()

スケジュール

	day1	day2	day3	day4	day5
レミトロ(デニロイキン ジフチトクス) 9 μ g/kg	↓	↓	↓	↓	↓

【注意】

- *視力障害、色覚異常があらわれることがあるため、投与開始前および投与期間中は定期的に眼科検査を実施すること。
- *毛細血管漏出症候群を軽減させるために、デニロイキン ジフチトクス投与前後に生食等の輸液を投与し、投与前および投与期間中は定期的に血清アルブミン値、血圧、脈拍、体重の測定を行うこと。
- *最大 8 コースまで。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1 - 5

- | | |
|--|----------------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② カロナール 500 mg | 内服 |
| ③ デキサメタゾン 6.6 mg + ポララミン 5 mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ④ 生食 250 mL | 点滴静注 30 分(500 mL/時間) |
| ⑤ レミトロ + 注射用水 20 mL + 生食 50 mL | 点滴静注 60 分(50 mL/時間) |
| レミトロは 1 バイアルを注射用水 2.1 mL に溶解後(150 μ g/mL)、 | |
| 必要量()mL を抜き取り、生食 50 mL に希釈する | |
| ⑥ 生食 250 mL | 点滴静注 30 分(500 mL/時間) |

デニロイキン ジフチトクス療法

	コース目				
	day1	day2	day3	day4	day5
月 日	/	/	/	/	/
レミトロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓

	コース目				
	day1	day2	day3	day4	day5
月 日	/	/	/	/	/
レミトロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓

	コース目				
	day1	day2	day3	day4	day5
月 日	/	/	/	/	/
レミトロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓

	コース目				
	day1	day2	day3	day4	day5
月 日	/	/	/	/	/
レミトロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓

	コース目				
	day1	day2	day3	day4	day5
月 日	/	/	/	/	/
レミトロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓

デニロイキン ジフチトクス療法

	コース目				
	day1	day2	day3	day4	day5
月 日	/	/	/	/	/
レミトロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓

	コース目				
	day1	day2	day3	day4	day5
月 日	/	/	/	/	/
レミトロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓

	コース目				
	day1	day2	day3	day4	day5
月 日	/	/	/	/	/
レミトロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓