

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

mini CHOP療法

週毎 コース予定悪性リンパ腫

主治医

指導医

HBs抗原(), HBs抗体(), HBc抗体(), HCV抗体()

スケジュール

		day1	day2	day3	day4	day5
プレドニン(プレドニゾロン)	40 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓
ドキシソルビシン	25 mg/m ²	↓				
オンコビン(ビンクリスチン)	1 mg/body	↓				
エンドキサン(シクロホスファミド)	400 mg/m ²	↓				

【注意】 *ドキシソルビシンの総投与量は500 mg/m²を超えないこと

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day1 抗がん薬投与1時間半前にアプレピタントカプセル 125 mg 1C 内服

- | | | | | |
|---|----------|--------------|---|------------------------------|
| ① | ソリタT3 | 200 mLにて血管確保 | | 維持(20 mL/時間) |
| ② | パロノセトロン | 0.75 mg | + | 生食 20 mL 側管静注 |
| ③ | プレドニン | | + | 生食 50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間) |
| ④ | ドキシソルビシン | | + | 生食 50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間) |
| ⑤ | オンコビン | | + | 生食 50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間) |
| ⑥ | エンドキサン | | + | 生食 100 mL 点滴静注60分(200 mL/時間) |

◎血管確保していたソリタT3をエンドキサンと同時滴下90分で点滴静注

day 2 - 3 アプレピタントカプセル 80 mg 1C 1×朝食後 内服

day 2 - 5 プレドニゾロン錠 内服

mini CHOP療法

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
	/	/	/	/	/	/	/	/
プレドニン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドキシルビシン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
オンコビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
エンドキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								