

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# mini CHOP療法

週毎 コース予定

悪性リンパ腫

主治医

指導医

HBs抗原( )、HBs抗体( )、HBc抗体( )、HCV抗体( )

スケジュール

		day1	day2	day3	day4	day5
プレドニン	40 mg/m <sup>2</sup>	↓	↓	↓	↓	↓
ドキシソルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>	↓				
オンコビン(ビンクリスチン)	1 mg/body	↓				
エンドキサン(シクロホスファミド)	400 mg/m <sup>2</sup>	↓				

【注意】 \*ドキシソルビシンの総投与量は500 mg/m<sup>2</sup>を超えないこと

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day1 抗がん薬投与1時間半前にアプレピタントカプセル125 mg 1C 内服

- |   |                    |   |                             |
|---|--------------------|---|-----------------------------|
| ① | ソリタT3 200 mLにて血管確保 |   | 維持(20 mL/時間)                |
| ② | パロノセトロン0.75 mg     | + | 生食20 mL 側管静注                |
| ③ | プレドニン              | + | 生食50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間)   |
| ④ | ドキシソルビシン           | + | 生食50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間)   |
| ⑤ | オンコビン              | + | 生食50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間)   |
| ⑥ | エンドキサン             | + | 生食100 mL 点滴静注60分(200 mL/時間) |

◎血管確保していたソリタT3をエンドキサンと同時滴下90分で点滴静注

day 2 - 3 アプレピタントカプセル80 mg 1C 1×朝食後 内服

day 2 - 5 プレドニン 内服

mini CHOP療法

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
	/	/	/	/	/	/	/	/
プレドニン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドキシソルビシン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
オンコピン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
エンドキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								