

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

mini CHOP[day1]+ 【BS】Rituximab療法【同日】

週毎 コース予定

悪性リンパ腫

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

		day1	day2	day3	day4	day5
リツキシマブBS	375 mg/m ²	↓				
プレドニン(プレドニゾロン)	40 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓
ドキシソルビン	25 mg/m ²	↓				
オンコビン(ビンクリスチン)	1 mg/body	↓				
エンドキサン(シクロホスファミド)	400 mg/m ²	↓				

【注意】 *ドキシソルビシンの総投与量は500 mg/m²を超えないこと

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

【初回のみ】 *初回投与は必ず入院で実施

day1 抗がん薬投与1時間半前にアプレピタントカプセル 125 mg 1C 内服

① イブプロフェン 100 mg _____錠、デザレックス 5 mg _____錠 内服

☆30分後より

② 生食 500 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)

③ リツキシマブBS + 生食 適量(10倍希釈)

◎輸液ポンプにて50 mL/時間で点滴静注

*注:総量600 mLを超える時はテルモ生食1Lを使用

- ④ 50 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
◎輸液ポンプにて100 mL/時間で点滴静注
- ⑤ 100 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
◎輸液ポンプにて150 mL/時間で点滴静注
- ⑥ 150 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
◎輸液ポンプにて200 mL/時間で点滴静注
- ⑦ 200 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
◎輸液ポンプにて250 mL/時間で点滴静注
- ⑧ 250 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
◎輸液ポンプにて300 mL/時間で点滴静注
- ⑨ 300 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
◎輸液ポンプにて350 mL/時間で点滴静注
- ⑩ 350 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
◎輸液ポンプにて400 mL/時間で点滴静注

- | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------|--------------------|
| ⑪ | パロノセトロン 0.75 mg | + | 生食 20 mL | 側管静注 |
| ⑫ | プレドニン | + | 生食 50 mL | 点滴静注5分(600 mL/時間) |
| ⑬ | ドキシソルビシン | + | 生食 50 mL | 点滴静注5分(600 mL/時間) |
| ⑭ | オンコビン | + | 生食 50 mL | 点滴静注5分(600 mL/時間) |
| ⑮ | エンドキサン | + | 生食 100 mL | 点滴静注60分(200 mL/時間) |

◎血管確保していた生食をエンドキサンと同時滴下90分で点滴静注

day 2 - 3 アプレピタントカプセル 80 mg 1C 1×朝食後 内服

day 2 - 5 プレドニゾロン錠 内服

【2回目以降】第1サイクルにおいて発現した有害事象がGrade 2以下であった場合

day1 抗がん薬投与1時間半前にアプレピタントカプセル 125 mg 1C 内服

- ① イブプロフェン 100 mg _____錠、デザレックス 5 mg _____内服

☆30分後より

- ② 生食500 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)

- ③ リツキシマブBS + 生食 適量(10倍希釈)

◎輸液ポンプにて100 mL/時間で点滴静注

*注:総量600 mLを超える時はテルモ生食1 Lを使用

- ④ 100 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎輸液ポンプにて200 mL/時間で点滴静注

- ⑤ 200 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎輸液ポンプにて300 mL/時間で点滴静注

- ⑥ 300 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎輸液ポンプにて400 mL/時間で点滴静注

- ⑦ パロノセトロン 0.75 mg + 生食 20 mL 側管静注

- ⑧ プレドニン + 生食 50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間)

- ⑨ ドキソルビシン + 生食 50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間)

- ⑩ オンコビン + 生食 50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間)

- ⑪ エンドキサン + 生食 100 mL 点滴静注60分(200 mL/時間)

◎血管確保していた生食をエンドキサンと同時滴下90分で点滴静注

day 2 - 3 アプレピタントカプセル 80 mg 1C 1×朝食後 内服

day 2 - 5 プレドニゾロン錠 内服

mini CHOP【day1】+【BS】Rituximab療法【同日】

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
	/	/	/	/	/	/	/	/
リツキシマブBS 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
プレドニン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドキシソルビシン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
オンコビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
エンドキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								