ID

氏名

年齢

科名　　病棟

エプコリタマブ療法

4 週毎　　コース予定

疾患名　DLBCL、濾胞性リンパ腫(Grade3B)

主治医　　指導医

HBs抗原(　)、HBs抗体(　)、HBc抗体(　)、HCV抗体(　)

スケジュール

【1コース目】

		day1	day8	day15	day22
エプキンリ(エプコリタマブ)	0.16 mg/body	↓			
	0.8 mg/body		↓		
	48 mg/body			↓	↓

【2～3コース目】

		day1	day8	day15	day22
エプキンリ(エプコリタマブ)	48 mg/body	↓	↓	↓	↓

【4～9コース目】

		day1	day15
エプキンリ(エプコリタマブ)	48 mg/body	↓	↓

【10コース目以降】

		day1
エプキンリ(エプコリタマブ)	48 mg/body	↓

【注意】 ＊ 1コース目の初回の48 mg投与後 48 時間は必ず入院管理とすること。

＊ 1コース目では特に腫瘍崩壊症候群およびサイトカイン放出症候群のリスクが高いため、以下の対応を考慮すること。

・本剤投与24時間前、および投与後24時間に2～3Lの水分を摂取する。

・本剤投与24時間前に降圧薬の服用を中断する。

・本剤投与日は、投与前に等張液500 mLを投与する。

＊ 以下のいずれかに該当する投与遅延があった場合は、サイトカイン放出症候群を軽減するため、1サイクル目の投与方法に戻して再び投与を開始すること。

・0.16 mgと0.8 mgの投与間隔が8日を超えた場合

・0.8 mgと48 mgの投与間隔が14日を超えた場合

・48 mgの投与間隔が6週間を超えた場合

その後は、予定されていた次の投与サイクルの1日目からの投与方法で投与を継続すること。

福岡大学化学療法プロトコール審査委員会承認（2023年12月22日）B0287
2025年3月21日改訂

エプコリタマブ療法【DLBCL、濾胞性リンパ腫Grade3B】

＊ 前回投与後にGrade2またはGrade3のサイトカイン放出症候群が発現した患者に対しては、Grade2以上のサイトカイン放出症候群が発現しなくなるまで本剤投与前と投与後3日目までプレドニゾロン100mgを投与すること。

＊ 大腿部、腹部等に左右交互に投与するなど同一注射部位を避けること。



通常量より減量する際の理由

（レジメン）

【1 コース目】

day1

①	生食500 mLにて血管確保	維持(20 mL/時間)
②	プレドニゾロン 5 mg 20 錠	内服
	デザレックス 5 mg 1 錠	内服
	カロナール 500 mg 2 錠	内服
	☆30分後より	
③	エプキンリ 0.16 mg	皮下注

day8

①	生食500 mLにて血管確保	維持(20 mL/時間)
②	プレドニゾロン 5 mg 20 錠	内服
	デザレックス 5 mg 1 錠	内服
	カロナール 500 mg 2 錠	内服
	☆30分後より	
③	エプキンリ 0.8 mg	皮下注

day15, 22

① 生食500 mLにて血管確保　維持(20 mL/時間)

② プレドニゾロン 5 mg 20 錠　内服

デザレックス 5 mg 1 錠　内服

カロナール 500 mg 2 錠　内服

☆30分後より

③ エプキンリ 48 mg　皮下注

day2～4 , 9～11, 16～18 , 23～25

プレドニゾロン 5 mg 20 錠　内服

【2～3 コース目】

day1, 8, 15, 22

① プレドニゾロン 5 mg 20 錠　内服

※前回投与後にGrade2～3のサイトカイン放出症候群を認めた場合に使用

☆30分後より

② エプキンリ 48 mg　皮下注

day2～4 , 9～11, 16～18 , 23～25

プレドニゾロン 5 mg 20 錠　内服

※前回投与後にGrade2～3のサイトカイン放出症候群を認めた場合に使用

【4～9 コース目】

day1, 15

① プレドニゾロン 5 mg 20 錠 内服

※前回投与後にGrade2～3のサイトカイン放出症候群を認めた場合に使用

☆30分後より

② エプキンリ 48 mg 皮下注

day2～4 , 16～18

プレドニゾロン 5 mg 20 錠 内服

※前回投与後にGrade2～3のサイトカイン放出症候群を認めた場合に使用

【10 コース目以降】

day1

① プレドニゾロン 5 mg 20 錠 内服

※前回投与後にGrade2～3のサイトカイン放出症候群を認めた場合に使用

☆30分後より

② エプキンリ 48 mg 皮下注

day2～4

プレドニゾロン 5 mg 20 錠 内服

※前回投与後にGrade2～3のサイトカイン放出症候群を認めた場合に使用

	1コース			
月 日	day1	day8	day15	day22
	/	/	/	/
エプキンリ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

	2コース			
月 日	day1	day8	day15	day22
	/	/	/	/
エプキンリ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

エプコリタマブ療法【DLBCL、濾胞性リンパ腫Grade3B】

	3コース			
月　日	day1	day8	day15	day22
	/	/	/	/
エプキンリ開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

	4コース		5コース		6コース	
月　日	day1	day15	day1	day15	day1	day15
	/	/	/	/	/	/
エプキンリ開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	7コース		8コース		9コース	
月　日	day1	day15	day1	day15	day1	day15
	/	/	/	/	/	/
エプキンリ開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

【10コース目以降】

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月　日	/	/	/	/	/	/	/	/
エプキンリ開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月　日	/	/	/	/	/	/	/	/
エプキンリ開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月　日	/	/	/	/	/	/	/	/
エプキンリ開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月　日	/	/	/	/	/	/	/	/
エプキンリ開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月　日	/	/	/	/	/	/	/	/
エプキンリ開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月　日	/	/	/	/	/	/	/	/
エプキンリ開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								