

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

モスネツズマブ療法

3 週毎 17 コース予定

疾患名 悪性リンパ腫

主治医 指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

スケジュール

【1コース目】

		day1	day8	day15
ルンスミオ(モスネツズマブ)	1 mg/body	↓		
	2 mg/body		↓	
	60 mg/body			↓

【2コース目】

		day1
ルンスミオ(モスネツズマブ)	60 mg/body	↓

【3～17コース目】

		day1
ルンスミオ(モスネツズマブ)	30 mg/body	↓

【注意】＊インラインフィルターは使用しないこと

- ＊1コース目は投与開始1～2日前から、1日2～3Lの水分摂取を行うこと
- ＊1コース目はモスネツズマブ投与終了後、少なくとも24時間は150～200 mL/時で補液を行うこと
- ＊8コース終了時に完全奏効が得られた場合は投与終了し、部分奏効または病勢安定であれば17コース目まで投与継続する
- ＊休薬後に再開する場合は、下表を参考に投与すること

前回投与日・投与量		前回投与日からの期間※1	投与方法
1サイクル目	1日目 1mg	2週間以上	1サイクル目1日目として、1mgで投与を再開すること。
	8日目 2mg	2週間以上 6週間未満	1サイクル目8日目として、2mgで投与を再開すること。
		6週間以上	1サイクル目として、1日目に1mg、8日目に2mg、15日目に60mgで投与を再開すること。
	15日目 60mg	6週間以上	2サイクル目として、1日目に1mg、8日目に2mg、15日目に60mgで投与を再開すること。3サイクル目以降は、1日目に30mgを投与すること。
2サイクル目 60mg		6週間以上	3サイクル目として、1日目に1mg、8日目に2mg、15日目に30mgで投与を再開すること※2。4サイクル目以降は、1日目に30mgを投与すること。
3サイクル目以降 30mg		6週間以上	1日目に1mg、8日目に2mg、15日目に30mgで投与を再開し※2、その後は1日目に30mgを投与すること。

※1：前回投与日からの期間が上記より短い場合は、予定されていた用量で投与を再開する。
※2：1、8、15日目については、本剤投与の60分前に、副腎皮質ホルモン剤を前投与すること。

モスネツズマブ療法

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

【1コース目】

Day 1

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| ① 生食 250 mLで血管確保 | 維持 |
| ② デキサメタゾン 19.8 mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ③ カロナール 500 mg 2錠 + デザレックス 5 mg 1錠 | 内服 |
| ☆60分後より | |
| ④ ルンスミオ 1 mg + 生食 99 mL(全量 100 mL) | 点滴静注240分(25 mL/時間) |

Day 8

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| ① 生食 250 mLで血管確保 | 維持 |
| ② デキサメタゾン 19.8 mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ③ カロナール 500 mg 2錠 + デザレックス 5 mg 1錠 | 内服 |
| ☆60分後より | |
| ④ ルンスミオ 2 mg + 生食 98 mL(全量 100 mL) | 点滴静注240分(25 mL/時間) |

Day 15

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| ① 生食 250 mLで血管確保 | 維持 |
| ② デキサメタゾン 19.8 mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ③ カロナール 500 mg 2錠 + デザレックス 5 mg 1錠 | 内服 |
| ☆60分後より | |
| ④ ルンスミオ 60 mg + 生食 190 mL(全量 250 mL) | 点滴静注240分(62.5 mL/時間) |

モスネツズマブ療法

【2コース目】

Day 1

- ① 生食 250 mLで血管確保

維持
- ② デキサメタゾン 19.8 mg + 生食 20 mL

側管静注
- ③ カロナール 500 mg 2錠 + デザレックス 5 mg 1錠

内服
- ☆60分後より
- ④ ルンスミオ 60 mg + 生食 190 mL(全量 250 mL)

点滴静注240分(62.5 mL/時間)
- ※1コース目の忍容性が良好な場合、2時間まで短縮可

【3～17コース目】

Day 1

- ① 生食 250 mLで血管確保

維持
- ② カロナール 500 mg 2錠 + デザレックス 5 mg 1錠

内服
- ☆60分後より
- ③ ルンスミオ 30 mg + 生食 70 mL(全量 100 mL)

点滴静注240分(25 mL/時間)
- ※1コース目の忍容性が良好な場合、2時間まで短縮可

	1コース目			2コース	3コース	4コース
	day1	day8	day15			
月日	/	/	/	/	/	/
ルンスミオ 開始時刻						
確認						

	5コース	6コース	7コース	8コース	9コース	10コース
月日	/	/	/	/	/	/
ルンスミオ 開始時刻						
確認						

	11コース	12コース	13コース	14コース	15コース	16コース
月日	/	/	/	/	/	/
ルンスミオ 開始時刻						
確認						

	17コース
月日	/
ルンスミオ 開始時刻	
確認	