

メルファラン大量療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

メルファラン大量療法

(自己末梢血幹細胞移植)

疾患名 多発性骨髄腫

主治医 _____ 指導医 _____
スケジュール

HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

	day-3	day-2	day-1	day0
アルケラン(メルファラン) 100 mg/m ²	↓	↓		
自己末梢血幹細胞の輸注				↓

- 【注意】 * 1日の尿量が2400 mL以上になるように化学療法開始前日より輸液を行う。
* メルファランは希釈後、経時的に安定性が低下するため1.5時間以内に投与を終了すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day -3

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mLにて血管確保 | 維持(20mL/時間) |
| ② グラニセトロン内服ゼリー (2mg) 1包 | 内服 |
| ③ デキサメタゾン注 9.9mg (3 mL) + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ④ アルケラン + 生食 250 mL | 点滴静注 60分 (300 mL/時間) |

day -2

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mLにて血管確保 | 維持(20mL/時間) |
| ② グラニセトロン内服ゼリー (2mg) 1包 | 内服 |
| ③ デキサメタゾン注 6.6mg (2 mL) + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ④ アルケラン + 生食 250 mL | 点滴静注 60分 (300 mL/時間) |

day -1

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| ① 生食 500 mLにて血管確保 | 維持(20mL/時間) |
| ② デキサメタゾン注 6.6mg (2 mL) + 生食 20 mL | 側管静注 |

day 0

- | | |
|--|--------------------------------|
| ① 生食 500 mLにて血管確保 | 維持(20mL/時間) |
| ② ハイドロコートン 100 mg + 生食 100 mL
レスカルミン 1A | 点滴静注 60分 (100 mL/時間)
ゆっくり静注 |
| ③ 末梢血幹細胞の輸注 | |

メルファラン大量療法

	day-3	day-2	day-1	day0
月日	/	/	/	/
アルケラン 開始時刻	↓	↓		
末梢血幹細胞輸注 開始時刻				↓
確認				

*アルケランの正確な開始時刻の記載をお願いします。