

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

ボルテゾミブ皮下注療法

3週毎 **コース予定**

疾患名 **多発性骨髄腫**

主治医 **指導医** HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

<<注射>> ベルケイド(ボルテゾミブ) 1.3 mg/m ²	day1.....4.....8.....11.....15 ↓ ↓ ↓ ↓ 休
<<内服>> レナデックス(デキサメタゾン)40mg/body	↓ ↓ ↓ ↓ 休

【注意】 *ボルテゾミブは1回投与量 1.3 mg/m²を生食で濃度が 2.5 mg/mL になるよう溶解し、皮下注射する。毎回同じ部位に皮下注射することがないように、注射部位をローテートする。

☆通常量より減量する際の理由☆


(レジメン)

day 1, 4, 8, 11

ベルケイド + 生食 適量 皮下注

*ベルケイドは1バイアルを生食 1.2mL に溶解後(2.5mg/mL の濃度となる)、必要量()mL を抜き取る。

レナデックス 内服



	コース				コース			
	day 1	day 4	day 8	day 11	day 1	day 4	day 8	day 11
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								

ボルテゾミブ皮下注療法

	コース				コース			
	day 1	day 4	day 8	day 11	day 1	day 4	day 8	day 11
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								

	コース				コース			
	day 1	day 4	day 8	day 11	day 1	day 4	day 8	day 11
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								

	コース				コース			
	day 1	day 4	day 8	day 11	day 1	day 4	day 8	day 11
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								