

ボルテゾミブ weekly 皮下注療法(4投1休)

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

ボルテゾミブweekly皮下注療法(4投1休)

5週毎 コース予定

疾患名 多発性骨髄腫

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

《注射》		day1	8	15	22	29
ベルケイド(ボルテゾミブ)	1.3 mg/m ²	↓		↓		↓		↓		休
《内服》										
レナデックス(デキサメタゾン)	40mg/body	↓		↓		↓		↓		休

【注意】*ボルテゾミブは1回投与量 1.3 mg/m²を生食で濃度が 2.5 mg/mLになるよう溶解し、皮下注射する。毎回同じ部位に皮下注射することがないように、注射部位をローテートする。

☆通常量より減量する際の理由☆


(レジメン)

day 1, 8, 15, 22

ベルケイド + 生食 適量 皮下注

*ベルケイドは1バイアルを生食 1.2mL に溶解後(2.5mg/mL の濃度となる)、必要量()mL を抜き取る。

レナデックス 内服



	コース				コース			
	day 1	day 8	day 15	day 22	day 1	day 8	day 15	day 22
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								

ボルテゾミブ weekly 皮下注療法(4 投 1 休)

	コース				コース			
	day 1	day 8	day 15	day 22	day 1	day 8	day 15	day 22
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								

	コース				コース			
	day 1	day 8	day 15	day 22	day 1	day 8	day 15	day 22
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								

	コース				コース			
	day 1	day 8	day 15	day 22	day 1	day 8	day 15	day 22
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								