

ID	
氏名	
年齢	病棟
科名	

ボルテゾミブ皮下注 +CPA+DEX(sVCD)療法

5 週毎 6 コース予定

疾患名 多発性骨髄腫

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール


《注射》		day1	day8	day15	day22	day29
ベルケイド(ボルテゾミブ)	1.3 mg/ m ²	↓	↓	↓	↓	休
《内服》						
エンドキサン(シクロホスファミド)	300 mg/ m ²	↓	↓	↓	↓	休
レナデックス(デキサメタゾン)	40 mg/ body	↓	↓	↓	↓	休

【注意】 *高齢者や感染症を合併する危険が高いと考えられる患者では、初回投与量を1レベル減量(シクロホスファミドは200mg/m²、デキサメタゾンは20mg)できる

*ボルテゾミブは1回投与量1.3 mg/m²を生食で濃度が2.5 mg/mLになるよう溶解し、皮下注射する。毎回同じ部位に皮下注射することがないように、注射部位をローテートする。

*シクロホスファミドの服用量は体表面積により算出し、50 mg 単位で切り捨てる。

☆通常量より減量する際の理由☆



(レジメン)

day 1, 8, 15, 22

① ベルケイド + 生食 適量 皮下注

* ベルケイドは1バイアルを生食1.2 mLに溶解後(2.5mg/mLの濃度となる)、必要量()mLを抜き取る。

エンドキサン錠 内服

レナデックス錠 内服

ボルテゾミブ皮下注+CPA+DEX(sVCD)療法

	コース				コース			
	day1	day8	day15	day22	day1	day8	day15	day22
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								

	コース				コース			
	day1	day8	day15	day22	day1	day8	day15	day22
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								

	コース				コース			
	day1	day8	day15	day22	day1	day8	day15	day22
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								