

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

DMPB(Dara 皮下注)療法

4 - 6 週毎 コース予定

疾患名 多発性骨髄腫

主治医 指導医 HBs 抗原() HBs 抗体() HBc 抗体() HCV 抗体()

スケジュール

【1コース目:42日間】

薬名	用量	day1	4	8	11	15	22	25	29	32	36	
ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800 mg/body	↓		↓		↓	↓		↓		↓	
ベルケイド(ボルテゾミブ)	1.3 mg/m ²	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓		
レナデックス(デキサメタゾン)	20 mg/body	↓		↓		↓	↓		↓		↓	
アルケラン(メルファラン)	9 mg/m ²	→ day1 - 4										
プレドニン(プレドニゾロン)	60 mg/m ²	→ day2 - 4										

【2 - 9コース目:42日間】

薬名	用量	day1	8	22	29	
ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800 mg/body	↓		↓		
ベルケイド(ボルテゾミブ)	1.3 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	
レナデックス(デキサメタゾン)	20 mg/body	↓		↓		
アルケラン(メルファラン)	9 mg/m ²	→ day1 - 4				
プレドニン(プレドニゾロン)	60 mg/m ²	→ day2 - 4				

【10コース目以降:28日間】

薬名	用量	day1
ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800 mg/body	↓
レナデックス(デキサメタゾン)	20 mg/body	↓

DMPB(Dara 皮下注)療法


【注意】

*ダラツムマブのインフュージョンリアクション発現時間中央値が約 4 時間のため、皮下投与終了後 3~4 時間は症状発現に注意すること


*慢性閉塞性肺疾患もしくは気管支喘息のある患者又はそれらの既往のある患者の場合、本剤投与後処置として気管支拡張薬、吸入ステロイドの投与を考慮すること。

*ST 合剤やアシクロビル等の内服を考慮すること

*ダラツムマブ・ボルテゾミブは、毎回同じ部位に皮下注射することがないように、注射部位をローテートする



ベルケイド投与部位



ダラキューロ投与部位

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

【1 コース目】

day1

- | | |
|--------------------|--------------|
| ① 生食 500 mL にて血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② レナデックス 4 mg 5 錠 | 内服 |
| レスタミン 10 mg 5 錠 | 内服 |
| カロナール 500 mg 2 錠 | 内服 |
| モンテルカスト 10 mg 1 錠 | 内服 |

☆1 時間後より

- | | |
|----------------------------|--------------|
| ③ ダラキューロ 1800 mg(全量 15 mL) | 皮下注(約 3~5 分) |
| ④ ベルケイド + 生食 適量 | 皮下注 |

*ベルケイドは1バイアルを生食 1.2 mL に溶解後(2.5 mg/mL)、必要量()mL を抜き取る

DMPB(Dara 皮下注)療法

day4, 11, 25, 32

- ① ベルケイド + 生食 適量 皮下注
*ベルケイドは1バイアルを生食 1.2 mL に溶解後(2.5 mg/mL)、必要量()mL を抜き取る

day8, 22, 29

- ① レナデックス 4 mg 5 錠 内服
レスタミン 10 mg 5 錠 内服
カロナール 500 mg 2 錠 内服
モンテルカスト 10 mg 1 錠 内服
☆1 時間後より
- ② ダラキューロ 1800 mg(全量 15 mL) 皮下注(約 3~5 分)
- ③ ベルケイド + 生食 適量 皮下注
*ベルケイドは1バイアルを生食 1.2 mL に溶解後(2.5 mg/mL)、必要量()mL を抜き取る

day15, 36

- ① レナデックス 4 mg 5 錠 内服
レスタミン 10 mg 5 錠 内服
カロナール 500 mg 2 錠 内服
モンテルカスト 10 mg 1 錠 内服
☆1 時間後より
- ② ダラキューロ 1800 mg(全量 15 mL) 皮下注(約 3~5 分)

day1 - 4 アルケラン 内服

day2 - 4 プレドニン 内服

DMPB(Dara 皮下注)療法

【2 - 9 コース目】

day 1, 22

- ① レナデックス 4 mg 5 錠 内服
レスタミン 10 mg 5 錠 内服
カロナール 500 mg 2 錠 内服
- ☆30 分後より
- ② ダラキューロ 1800 mg(全量 15 mL) 皮下注(約 3~5 分)
- ③ ベルケイド + 生食 適量 皮下注
- *ベルケイドは1バイアルを生食 1.2 mL に溶解後(2.5 mg/mL)、必要量()mL を抜き取る

day 8, 29

- ① ベルケイド + 生食 適量 皮下注
- *ベルケイドは1バイアルを生食 1.2 mL に溶解後(2.5 mg/mL)、必要量()mL を抜き取る

day1 - 4 アルケラン 内服

day2 - 4 プレドニン 内服

【10 コース目以降】

day 1

- ① レナデックス 4 mg 5 錠 内服
レスタミン 10 mg 5 錠 内服
カロナール 500 mg 2 錠 内服
- ☆30 分後より
- ② ダラキューロ 1800 mg(全量 15 mL) 皮下注(約 3~5 分)

DMPB(Dara 皮下注)療法

1 コース目

	day1	day4	day8	day11	day15	day22	day25	day29	day32	day36
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ダラキューロ 開始時刻	↓		↓		↓	↓		↓		↓
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	

2 - 9 コース目

	2 コース目				3 コース目			
	day1	day8	day22	day29	day1	day8	day22	day29
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ダラキューロ 開始時刻	↓		↓		↓		↓	
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

	4 コース目				5 コース目			
	day1	day8	day22	day29	day1	day8	day22	day29
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ダラキューロ 開始時刻	↓		↓		↓		↓	
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

	6 コース目				7 コース目			
	day1	day8	day22	day29	day1	day8	day22	day29
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ダラキューロ 開始時刻	↓		↓		↓		↓	
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

	8 コース目				9 コース目			
	day1	day8	day22	day29	day1	day8	day22	day29
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ダラキューロ 開始時刻	↓		↓		↓		↓	
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

DMPB(Dara 皮下注)療法

10 コース目以降

	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目
月 日	/	/	/	/	/
ダラキューロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓

	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目
月 日	/	/	/	/	/
ダラキューロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓

	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目
月 日	/	/	/	/	/
ダラキューロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓

	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目
月 日	/	/	/	/	/
ダラキューロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓

	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目
月 日	/	/	/	/	/
ダラキューロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓