

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

## Dara-Car-DEX(Dara 皮下注)療法

4 週毎 コース予定

疾患名 多発性骨髄腫

主治医 指導医 HBs 抗原( ) HBs 抗原( ) HBc 抗体( ) HCV 抗体( )

(スケジュール)

## 【1 コース目】

《注射》	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day22
カイクロリス(カルフィルゾミブ) 20 mg/m <sup>2</sup>	↓	↓					
56 mg/m <sup>2</sup>			↓	↓	↓	↓	
ダラキューロ(ダラツムマブ) 1800 mg/body	↓		↓		↓		↓
-----							
《内服》							
レナデックス(デキサメタゾン) 40 mg/body							↓

## 【2 コース目】

《注射》	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day22
カイクロリス(カルフィルゾミブ) 56 mg/m <sup>2</sup>	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
ダラキューロ(ダラツムマブ) 1800 mg/body	↓		↓		↓		↓
-----							
《内服》							
レナデックス(デキサメタゾン) 40 mg/body							↓

## 【3-6 コース目】

《注射》	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day22
カイクロリス(カルフィルゾミブ) 56 mg/m <sup>2</sup>	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
ダラキューロ(ダラツムマブ) 1800 mg/body	↓				↓		
-----							
《内服》							
レナデックス(デキサメタゾン) 40 mg/body							↓

## 【7 コース目以降】

《注射》	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day22
カイクロリス(カルフィルゾミブ) 56 mg/m <sup>2</sup>	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
ダラキューロ(ダラツムマブ) 1800 mg/body	↓						
-----							
《内服》							
レナデックス(デキサメタゾン) 40 mg/body							↓

## Dara-Car-DEX(Dara 皮下注)療法

### 【注意】

\*ダラツムマブのインフュージョンリアクション発現時間の中央値が約 4 時間のため、皮下投与終了後 3~4 時間は症状発現に注意すること

\*慢性閉塞性肺疾患もしくは気管支喘息のある患者又はそれらの既往歴のある患者の場合、本剤投与後処置として気管支拡張薬、吸入ステロイドの投与を考慮すること。

\*ST 合剤やアシクロビル等の内服を考慮すること

\*75 歳を超える場合、デキサメタゾンは減量可能とする(詳細はダラキューロ適正使用ガイドを参照)

\*体表面積が 2.2 m<sup>2</sup>を超える患者では、体表面積 2.2 m<sup>2</sup>としてカルフィゾミブの投与量を算出すること

☆通常量より減量する際の理由☆

### (レジメン)

#### 【1 コース目】

##### day 1

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mL にて血管確保                 | 維持(20 mL/時間)         |
| ② レスタミン錠 10 mg 5 錠                 | 内服                   |
| カロナール錠 500 mg 2 錠                  | 内服                   |
| モンテルカスト錠 10 mg 1 錠                 | 内服                   |
| ③ デキサメタゾン 16.5 mg(5 mL) + 生食 50 mL | 点滴静注 5 分(600 mL/時間)  |
| ☆30 分後より                           |                      |
| ④ カイプロリス + 注射用水 適量 + 5%ブドウ糖 100 mL | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |
| ⑤ ダラキューロ 1800 mg(15 mL)            | 皮下注(約 3~5 分)         |

##### day 2

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mL にて血管確保                 | 維持(20 mL/時間)         |
| ② デキサメタゾン 16.5 mg(5 mL) + 生食 50 mL | 点滴静注 5 分(600 mL/時間)  |
| ③ カイプロリス + 注射用水 適量 + 5%ブドウ糖 100 mL | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |

Dara-Car-DEX(Dara 皮下注)療法

day 8, 15

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mL にて血管確保                 | 維持(20 mL/時間)         |
| ② レスタミン錠 10 mg 5 錠                 | 内服                   |
| カロナール錠 500 mg 2 錠                  | 内服                   |
| モンテルカスト錠 10 mg 1 錠                 | 内服                   |
| ③ デキサメタゾン 16.5 mg(5 mL) + 生食 50 mL | 点滴静注 5 分(600 mL/時間)  |
| ☆30 分後より                           |                      |
| ④ カイプロリス + 注射用水 適量 + 5%ブドウ糖 100 mL | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |
| ⑤ ダラキューロ 1800 mg(15 mL)            | 皮下注(約 3~5 分)         |

day 9, 16

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mL にて血管確保                 | 維持(20 mL/時間)         |
| ② デキサメタゾン 16.5 mg(5 mL) + 生食 50 mL | 点滴静注 5 分(600 mL/時間)  |
| ③ カイプロリス + 注射用水 適量 + 5%ブドウ糖 100 mL | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |

day 22

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| ① レナデックス錠 4 mg 10 錠     | 内服           |
| レスタミン錠 10 mg 5 錠        | 内服           |
| カロナール錠 500 mg 2 錠       | 内服           |
| モンテルカスト錠 10 mg 1 錠      | 内服           |
| ☆60 分後より                |              |
| ② ダラキューロ 1800 mg(15 mL) | 皮下注(約 3~5 分) |

Dara-Car-DEX(Dara 皮下注)療法

【2コース目】

day 1, 8, 15

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| ① 生食 500 mL にて血管確保                    | 維持(20 mL/時間)        |
| ② レスタミン錠 10 mg 5錠<br>カロナール錠 500 mg 2錠 | 内服<br>内服            |
| ③ デキサメタゾン 16.5 mg(10 mL) + 生食 50 mL   | 点滴静注 5分(600 mL/時間)  |
| ④ カイプロリス + 注射用水 適量 + 5%ブドウ糖 100 mL    | 点滴静注 30分(200 mL/時間) |
| ⑤ ダラキューロ 1800 mg(15 mL)               | 皮下注(約 3~5分)         |

day 2, 9, 16

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| ① 生食 500 mL にて血管確保                 | 維持(20 mL/時間)        |
| ② デキサメタゾン 16.5 mg(5 mL) + 生食 50 mL | 点滴静注 5分(600 mL/時間)  |
| ③ カイプロリス + 注射用水 適量 + 5%ブドウ糖 100 mL | 点滴静注 30分(200 mL/時間) |

day 22

- |  |                |
|--|----------------|
| ① レナデックス錠 4 mg 10錠<br>レスタミン錠 10 mg 5錠<br>カロナール錠 500 mg 2錠<br>☆30分後より | 内服<br>内服<br>内服 |
| ② ダラキューロ 1800 mg(15 mL)  | 皮下注(約 3~5分)    |

Dara-Car-DEX(Dara 皮下注)療法

【3-6 コース目】

day 1, 15

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mL にて血管確保                  | 維持(20 mL/時間)         |
| ② レスタミン錠 10 mg 5 錠                  | 内服                   |
| カロナール錠 500 mg 2 錠                   | 内服                   |
| ③ デキサメタゾン 16.5 mg(10 mL) + 生食 50 mL | 点滴静注 5 分(600 mL/時間)  |
| ④ カイプロリス + 注射用水 適量 + 5%ブドウ糖 100 mL  | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |
| ⑤ ダラキューロ 1800 mg(15 mL)             | 皮下注(約 3~5 分)         |

day 2, 8, 9, 16

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mL にて血管確保                 | 維持(20 mL/時間)         |
| ② デキサメタゾン 16.5 mg(5 mL) + 生食 50 mL | 点滴静注 5 分(600 mL/時間)  |
| ③ カイプロリス + 注射用水 適量 + 5%ブドウ糖 100 mL | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |

day 22 レナデックス錠 4 mg 10 錠 内服

【7 コース目以降】

day 1

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mL にて血管確保                  | 維持(20 mL/時間)         |
| ② レスタミン錠 10 mg 5 錠                  | 内服                   |
| カロナール錠 500 mg 2 錠                   | 内服                   |
| ③ デキサメタゾン 16.5 mg(10 mL) + 生食 50 mL | 点滴静注 5 分(600 mL/時間)  |
| ④ カイプロリス + 注射用水 適量 + 5%ブドウ糖 100 mL  | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |
| ⑤ ダラキューロ 1800 mg(15 mL)             | 皮下注(約 3~5 分)         |

Dara-Car-DEX(Dara 皮下注)療法

day 2, 8, 9, 15, 16

- ① 生食 500 mL にて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② デキサメタゾン 16.5 mg(5 mL) + 生食 50 mL 点滴静注 5分(600 mL/時間)
- ③ カイプロリス + 注射用水 適量 + 5%ブドウ糖 100 mL  
点滴静注 30分(200 mL/時間)

day 22 レナデックス錠 4 mg 10 錠 内服

1 コース目							
	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day22
月 日	/	/	/	/	/	/	/
カイプロリス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
ダラキューロ 開始時刻	↓		↓		↓		↓

2 コース目							
	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day22
月 日	/	/	/	/	/	/	/
カイプロリス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
ダラキューロ 開始時刻	↓		↓		↓		↓

3 コース目							
	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day22
月 日	/	/	/	/	/	/	/
カイプロリス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
ダラキューロ 開始時刻	↓				↓		

Dara-Car-DEX(Dara 皮下注)療法

4 コース目							
	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day22
月 日	/	/	/	/	/	/	/
カイトロリス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
ダラキューロ 開始時刻	↓				↓		

5 コース目							
	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day22
月 日	/	/	/	/	/	/	/
カイトロリス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
ダラキューロ 開始時刻	↓				↓		

6 コース目							
	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day22
月 日	/	/	/	/	/	/	/
カイトロリス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
ダラキューロ 開始時刻	↓				↓		

※7 コース目以降

コース目							
	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day22
月 日	/	/	/	/	/	/	/
カイトロリス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
ダラキューロ 開始時刻	↓						

Dara-Car-DEX(Dara 皮下注)療法

コース目							
	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day22
月 日	/	/	/	/	/	/	/
カイトロリス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
ダラキューロ 開始時刻	↓						

コース目							
	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day22
月 日	/	/	/	/	/	/	/
カイトロリス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
ダラキューロ 開始時刻	↓						

コース目							
	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day22
月 日	/	/	/	/	/	/	/
カイトロリス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
ダラキューロ 開始時刻	↓						

コース目							
	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day22
月 日	/	/	/	/	/	/	/
カイトロリス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
ダラキューロ 開始時刻	↓						