

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

## BLd療法

3週毎 コース予定

疾患名 多発性骨髄


主治医 指導医 HBs抗原( )、HBs抗体( )、HBc抗体( )、HCV抗体( )  
(スケジュール)

薬名	用量	day1	2	4	5	8	9	11	12	14
ポルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	↓		↓		↓		↓		
レナリドミド	25 mg/body	↓	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	↓
レナデックス(デキサメタゾン)	20 mg/body	↓ ↓		↓ ↓		↓ ↓		↓ ↓		↓ ↓

【注意】 \* ST合剤やアシクロビル等の内服を考慮すること

\* ポルテゾミブは1回投与量1.3 mg/m<sup>2</sup>を生食で濃度が2.5 mg/mLになるよう溶解し、皮下注射する。毎回同じ部位に皮下注射することがないように、注射部位をローテートする。

☆通常より減量する際の理由☆



(レジメン)

day 1 - 14

レナリドミドカプセル

内服

day1, 4, 8, 11

① レナデックス 4 mg 5錠

内服

② ポルテゾミブ + 生食 適量

皮下注

\* ポルテゾミブは1バイアルを生食1.2 mLに溶解後(2.5 mg/mL)、必要量( )mLを抜き取る。

day2, 5, 9, 12 レナデックス 4 mg 5錠

内服

	コース目				コース目			
	day1	day4	day8	day11	day1	day4	day8	day11
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ポルテゾミブ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								

	コース目				コース目			
	day1	day4	day8	day11	day1	day4	day8	day11
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ポルテゾミブ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								

	コース目				コース目			
	day1	day4	day8	day11	day1	day4	day8	day11
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ポルテゾミブ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								

	コース目				コース目			
	day1	day4	day8	day11	day1	day4	day8	day11
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ポルテゾミブ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								

	コース目				コース目			
	day1	day4	day8	day11	day1	day4	day8	day11
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ポルテゾミブ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								

	コース目				コース目			
	day1	day4	day8	day11	day1	day4	day8	day11
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ポルテゾミブ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
投与部位								
確認								