

DBLd療法(移植適応)

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

DBLd療法(移植適応)

4週毎 コース予定

疾患名 多発性骨髓腫(移植適応)

主治医 指導医
(スケジュール)

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

【1~2 コース目】

《注射》		day	1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	21	22
ダラキьюロ(ダラツムマブ)	1800 mg/body		↓				↓					↓		↓
ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²		↓		↓	↓					↓			
《内服》														
レナリドミド	25 mg/body		↓	↓
レナデックス(デキサメタゾン)	10~40 mg/body		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

【3~6 コース目】

《注射》		day	1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	21
ダラキьюロ(ダラツムマブ)			↓									↓	
ボルテゾミブ			↓		↓	↓					↓		
《内服》													
レナリドミド			↓	↓
レナデックス(デキサメタゾン)			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

【7 コース目以降】

《注射》		day	1	28									
ダラキьюロ(ダラツムマブ)	1800 mg/body		↓										
《内服》													
レナリドミド			↓									
レナデックス(デキサメタゾン)			↓									

【注意】 * 1~4コース目を寛解導入療法として行い、移植後に5~6コース目を地固め療法として行う。

* ダラツムマブのインフュージョンリアクション発現時間中央値が約4時間のため、

皮下投与終了後3~4時間は症状発現に注意すること。

* ST合剤や抗ウイルス薬などの予防内服を考慮すること。

* ボルテゾミブは1回投与量1.3 mg/m²を生食で濃度が2.5 mg/mLになるよう溶解し、

皮下注射する。毎回同じ部位に皮下注射するがないように、注射部位をローテートする。

DBLd療法(移植適応)



☆通常より減量する際の理由☆

(レジメン)

【1コース目】

day 1

- | | |
|-------------------|--------------|
| ① 生食 500 mLにて血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② デザレックス 5 mg 1錠 | 内服 |
| カロナール 500 mg 2錠 | 内服 |
| レナデックス 4 mg 10錠 | 内服 |
| モンテルカスト 10 mg 1錠 | 内服 |

★1時間後より

- | | |
|---------------------------|-----|
| ③ ダラキューロ 1800 mg(全量15 mL) | 皮下注 |
| ④ ボルテゾミブ + 生食 適量 | 皮下注 |

*ボルテゾミブは1バイアルを生食1.2 mLに溶解後(2.5 mg/mL)、必要量()mLを抜き取る

day 4, 11

- | | |
|-------------------|-----|
| ① レナデックス 4 mg 10錠 | 内服 |
| ② ボルテゾミブ + 生食 適量 | 皮下注 |

*ボルテゾミブは1バイアルを生食1.2 mLに溶解後(2.5 mg/mL)、必要量()mLを抜き取る

day 8

- | | |
|------------------|----|
| ① デザレックス 5 mg 1錠 | 内服 |
| カロナール 500 mg 2錠 | 内服 |
| レナデックス 4 mg 5錠 | 内服 |

★1時間後より

DBLd療法(移植適応)

②ダラキьюロ 1800 mg(全量15 mL) 皮下注

③ ボルテゾミブ + 生食 適量 皮下注

*ボルテゾミブは1バイアルを生食1.2 mLに溶解後(2.5 mg/mL)、必要量()mLを抜き取る

day 15, 22

① デザレックス 5 mg 1錠 内服

カロナール 500 mg 2錠 内服

レナデックス 4 mg 2.5錠 内服

☆1時間後より

②ダラキьюロ 1800 mg(全量15 mL) 皮下注

day 2, 3, 9, 10, 12 レナデックス 4 mg 10錠 内服

day 1 - 21 レナリドミドカプセル 25 mg 内服

【2コース目】

day 1

① デザレックス 5 mg 1錠 内服

カロナール 500 mg 2錠 内服

レナデックス 4 mg 10錠 内服

☆1時間後より

② ダラキьюロ 1800 mg(全量15 mL) 皮下注

③ ボルテゾミブ + 生食 適量 皮下注

*ボルテゾミブは1バイアルを生食1.2 mLに溶解後(2.5 mg/mL)、必要量()mLを抜き取る

day 4, 11

① レナデックス 4 mg 10錠 内服

② ボルテゾミブ + 生食 適量 皮下注

*ボルテゾミブは1バイアルを生食1.2 mLに溶解後(2.5 mg/mL)、必要量()mLを抜き取る

DBLd療法(移植適応)

day 8

① デザレックス 5 mg 1錠	内服
カロナール 500 mg 2錠	内服
レナデックス 4 mg 2.5錠	内服
<u>☆1時間後より</u>	
②ダラキューロ 1800 mg(全量15 mL)	皮下注
③ ボルテゾミブ + 生食 適量	皮下注

*ボルテゾミブは1バイアルを生食1.2 mLに溶解後(2.5 mg/mL)、必要量()mLを抜き取る

day 15, 22

① デザレックス 5 mg 1錠	内服
カロナール 500 mg 2錠	内服
レナデックス 4 mg 2.5錠	内服
<u>☆1時間後より</u>	
②ダラキューロ 1800 mg(全量15 mL)	皮下注

day 2, 3, 9, 10, 12 レナデックス 4 mg 10錠 内服

day 1 - 21 レナリドミドカプセル 25 mg 内服

【3-6コース目】

day 1

① デザレックス 5 mg 1錠	内服
カロナール 500 mg 2錠	内服
レナデックス 4 mg 10錠	内服
<u>☆1時間後より</u>	
②ダラキューロ 1800 mg(全量15 mL)	皮下注

③ ボルテゾミブ + 生食 適量 皮下注

*ボルテゾミブは1バイアルを生食1.2 mLに溶解後(2.5 mg/mL)、必要量()mLを抜き取る

DBLd療法(移植適応)

day 4, 11

① レナデックス 4 mg 10錠

内服

② ボルテゾミブ + 生食 適量

皮下注

*ボルテゾミブは1バイアルを生食1.2 mLに溶解後(2.5 mg/mL)、必要量()mLを抜き取る

day 8

① ボルテゾミブ + 生食 適量

皮下注

*ボルテゾミブは1バイアルを生食1.2 mLに溶解後(2.5 mg/mL)、必要量()mLを抜き取る

day 15

① デザレックス 5 mg 1錠

内服

カロナール 500 mg 2錠

内服

レナデックス 4 mg 2.5錠

内服

☆1時間後より

②ダラキьюロ 1800 mg(全量15 mL)

皮下注

day 2, 3, 9, 10, 12

レナデックス 4 mg 10錠

内服

day 1 - 21

レナリドミドカプセル 25 mg

内服

【7コース目以降】

day 1

① デザレックス 5 mg 1錠

内服

カロナール 500 mg 2錠

内服

レナデックス 4 mg 2.5錠

内服

☆1時間後より

②ダラキьюロ 1800 mg(全量15 mL)

皮下注

day 1 - 28

レナリドミドカプセル 10 mg

内服

DBLd療法(移植適応)

	1 コース目					
	day1	day4	day8	day11	day15	day22
月日	/	/	/	/	/	/
ダラキュー口 開始時刻 投与部位	↓		↓		↓	↓
ボルテゾミブ 開始時刻 投与部位	↓	↓	↓	↓		
確認						

	2 コース目					
	day1	day4	day8	day11	day15	day22
月日	/	/	/	/	/	/
ダラキュー口 開始時刻 投与部位	↓		↓		↓	↓
ボルテゾミブ 開始時刻 投与部位	↓	↓	↓	↓		
確認						

	3 コース目					4 コース目				
	day1	day4	day8	day11	day15	day1	day4	day8	day11	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ダラキュー口 開始時刻 投与部位	↓				↓	↓				↓
ボルテゾミブ 開始時刻 投与部位	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	
確認										

	5 コース目					6 コース目				
	day1	day4	day8	day11	day15	day1	day4	day8	day11	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ダラキュー口 開始時刻 投与部位	↓				↓	↓				↓
ボルテゾミブ 開始時刻 投与部位	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	
確認										

※7コース目以降

	コース目						
	day1						
月日	/	/	/	/	/	/	/
ダラキュー口 開始時刻 投与部位	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							