

TIP療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

TIP療法

3 週毎 コース予定

疾患名 精巣腫瘍

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

スケジュール

		day1	day2	day3	day4	day5	day6
パクリタキセル	210 mg/m ²	↓					
イホマイド(イホスファミド)	1.2 g/m ²		↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン	20 mg/m ²		↓	↓	↓	↓	↓
ウロミテキサン(メスナ)	240 mg/m ² /回		↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓

【注意】 * パクリタキセルはインラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用し、
DEHPフリー点滴セットを使用すること。

* アルコール過敏 有・無

* 1日の尿量が3000 mL以上になるように化学療法開始前日より輸液を行う。

* 必要時、補液にメイロンを混注して尿量を確保する。

* イホスファミド投与時は出血性膀胱炎予防目的でメスナを点滴する。

メスナの1回投与量は、イホスファミド1日投与量の20%量とする。

* シスプラチンは遮光のこと

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

Day 1

- | | |
|---|---------------------|
| ① 生食 500 mLで血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② レスタミン錠(10 mg) 5錠 | 内服 |
| ③ デキサメタゾン 16.5 mg + ファモチジン 20 mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ④ パクリタキセル + 生食 500 mL | 点滴静注180分(167 mL/時間) |

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

福岡大学病院化学療法プロトコール審査委員会承認 (平成29年12月22日) B0405

2025年5月23日改訂

Day 2 抗がん薬投与1時間半前にアプレピタントカプセル（125 mg）10を内服

- | | |
|---|-------------------------|
| ① 生食 500 mLで血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② パロノセトロン 0.75mg + デキサメタゾン 9.9 mg + 生食 100 mL | 点滴静注30分(200 mL/時間) |
| ③ イホマイド + 生食 100 mL | 点滴静注30分(200 mL/時間) |
| ウロミテキサン | 側管静注 イホスファミド開始時(1回目) |
| ④ ソルデム3A 500mL | 点滴静注90分(333 mL/時間) |
| ⑤ 20%マンニット 300mL | 点滴静注30分(600 mL/時間) |
| ⑥ シスプラチン + 生食 500 mL | 点滴静注120分(250 mL/時間) |
| ⑦ ウロミテキサン | 側管静注 イホスファミド開始4時看護(2回目) |
| ⑧ ソルデム3A 500mL | 点滴静注120分(250 mL/時間) |
| ⑨ 生食 1000mL | 点滴静注10時間(100 mL/時間) |
| * 尿量をみて補液を追加 | |
| ⑩ ウロミテキサン | 側管静注 イホスファミド開始8時看護(3回目) |
| ⑪ オランザピン 5 mg 1錠 1×タ 内服(※糖尿病患者は禁忌) | |

Day 3 - 6

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| ① 生食 500 mLで血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 100 mL | 点滴静注30分(200 mL/時間) |
| ③ イホマイド + 生食 500 mL | 点滴静注120分(250 mL/時間) |
| ウロミテキサン | 側管静注 イホスファミド開始時(1回目) |
| ④ ソルデム3A 500mL | 点滴静注90分(333 mL/時間) |
| ⑤ 20%マンニット 300mL | 点滴静注30分(600 mL/時間) |
| ⑥ シスプラチン + 生食 500 mL | 点滴静注120分(250 mL/時間) |
| ⑦ ウロミテキサン | 側管静注 イホスファミド開始4時看護(2回目) |

TIP療法

⑧ ソルデム3A 500mL

点滴静注120分(250 mL/時間)

⑨ 生食 500mL

点滴静注5時間(100 mL/時間)

* 尿量をみて補液を追加

⑩ ウロミテキサン

側管静注 イホスファミド開始8時看護(3回目)

Day 3 - 6 アプレピタントカプセル(80mg) 1C 1× 朝 内服

Day 3 - 5 オランザピン 5 mg 1錠 1×タ 内服(※糖尿病患者は禁忌)

Day 7, 8 デキサメタゾン 4 mg 2錠 2×朝昼 内服

	コース					
	day1	day2	day3	day4	day5	day6
月 日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓					
イホマイド 開始時刻		↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時刻		↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース					
	day1	day2	day3	day4	day5	day6
月 日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓					
イホマイド 開始時刻		↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時刻		↓	↓	↓	↓	↓
確認						