

TIP 療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

TIP 療法

3 週毎 コース予定

疾患名 精巣腫瘍

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day 1	2	3	4	5	6
パクリタキセル	210mg/m ²	↓					
イホマイド(イホスファミド)	1.2g/m ²		↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン	20mg/m ²		↓	↓	↓	↓	↓

ウロミテキサン(メスナ)	240mg/m ² /回		↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓

【注意】 *パクリタキセルはインラインフィルター(0.2 又は 0.22 ミクロン)を使用し、DEHP フリー点滴セットを使用すること。

*アルコール過敏 有・無

*1 日の尿量が 3000 mL 以上になるように化学療法開始前日より輸液を行う。

*必要時、補液にメイロンを混注して尿量を確保する。

*イホスファミド投与時は出血性膀胱炎予防目的でメスナを投与する。

メスナの 1 回投与量(mg)は、イホスファミド 1 日投与量(mg)の 20%量とする。

*シスプラチンは遮光のこと

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day1

① 生食 500 mL で血管確保

維持(20 mL/時間)

② レスタミン(10 mg) 5 錠 内服

ファモチジン 20 mg

側管静注

デキサメタゾン 16.5 mg + 生食 20 mL

側管静注

☆30 分後より

③ パクリタキセル + 生食 500 mL

点滴静注 180 分(167mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

福岡大学病院化学療法プロトコール審査委員会承認 (平成 29 年 12 月 22 日) B0405

令和 3 年 11 月 19 日改訂

TIP 療法

day2

抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル (125 mg) 1C を内服

- | | |
|--|--------------------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② パロノセトロン 0.75mg + デキサメタゾン 9.9 mg + 生食 100mL | 点滴静注 30 分(200mL/時間) |
| ③ イホマイド + 生食 100 mL | 点滴静注 30 分(200mL/時間) |
| ウロミテキサン | 側管静注 イホマイド開始時(1 回目) |
| ④ ソルデム3A 500 mL | 点滴静注 90 分(333mL/時間) |
| ⑤ 20%マンニトール 300 mL | 点滴静注 30 分(600mL/時間) |
| ⑥ シスプラチン + 生食 500 mL | 点滴静注 120 分(250mL/時間) |
| ⑦ ウロミテキサン | 側管静注 イホマイド開始 4 時間後(2 回目) |
| ⑧ ソルデム3A 500 mL | 点滴静注 120 分(250mL/時間) |
| ⑨ 生食 1000 mL | 点滴静注 10 時間(100mL/時間) |

*尿量をみて補液を追加

- | | |
|-----------|--------------------------|
| ⑩ ウロミテキサン | 側管静注 イホマイド開始 8 時間後(3 回目) |
|-----------|--------------------------|

day3-6

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 100 mL | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |
| ③ イホマイド + 生食 100 mL | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |
| ウロミテキサン | 側管静注 イホマイド開始時(1 回目) |
| ④ ソルデム3A 500 mL | 点滴静注 90 分(333 mL/時間) |
| ⑤ 20%マンニトール 300 mL | 点滴静注 30 分(600 mL/時間) |
| ⑥ シスプラチン + 生食 500 mL | 点滴静注 120 分(250 mL/時間) |
| ⑦ ウロミテキサン | 側管静注 イホマイド開始 4 時間後(2 回目) |
| ⑧ ソルデム3A 500 mL | 点滴静注 120 分(250 mL/時間) |
| ⑨ 生食 1000 mL | 点滴静注 10 時間(100 mL/時間) |

TIP 療法

*尿量をみて補液を追加

⑩ ウロミテキサン

側管静注 イホマイド開始 8 時間後(3 回目)

day3, 4 アプレピタントカプセル (80 mg) 1C 1x 朝

	コース					
	day1	day2	day3	day4	day5	day6
月 日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓					
イホマイド 開始時刻		↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時刻		↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース					
	day1	day2	day3	day4	day5	day6
月 日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓					
イホマイド 開始時刻		↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時刻		↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース					
	day1	day2	day3	day4	day5	day6
月 日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓					
イホマイド 開始時刻		↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時刻		↓	↓	↓	↓	↓
確認						

TIP 療法

確認						
----	--	--	--	--	--	--