

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Trabectedin 療法

3 週毎 コース予定

疾患名 悪性軟部腫瘍

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1
ヨンドリス(トラベクテジン)	1.2 mg/m ²	↓

【注意】*薬液が漏出した場合、重度の組織障害を起こすおそれがあるので、中心静脈から投与すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1 ≪中心静脈より投与≫

① 9:00 生食 500 mL CVポートより 維持(20 mL/時間)

② 9:30 パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 16.5 mg + 生食 50 mL

CVポートより 点滴静注 15 分(200 mL/時間)

◎メインの生食でルート内フラッシュ

☆30 分後より

③ 10:30 ヨンドリス + 生食 500 mL CVポートより 点滴静注 24 時間(20 mL/時間)

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュ

day 2, 3 デキサメタゾン錠 8 mg 内服

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月 日	/	/	/	/	/	/
ヨンドリス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						