

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Eribulin 療法

3 週毎 コース予定

疾患名 悪性軟部腫瘍

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day8	day15
ハラヴェン(エリブリン)	1.4 mg/m ²	↓	↓	休

【注意】* 生食に希釈して投与する際は、0.02 mg/mL 未満の濃度に希釈しないこと。

* 投与量が 1 mg 以下の場合、希釈液の量を調節すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1, 8

- | | |
|---|---------------------|
| ① 9:00 生食 250 mL で血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② 9:30 デキサメタゾン注 6.6 mg(2 mL) + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ③ 10:00 ハラヴェン + 生食 50 mL | 点滴静注 5 分(600 mL/時間) |

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュ

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ハラヴェン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								

Eribulin 療法

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ハラヴェン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ハラヴェン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ハラヴェン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ハラヴェン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ハラヴェン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								