

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

DTIC療法

4 週毎 5 コース予定

疾患名 悪性黒色腫

主治医

指導医

HBs抗原(), HBs抗体(), HBc抗体()

スケジュール

		day1
ダカルバジン	1000 mg/m ²	↓

【注意】* ダカルバジンは血管痛予防のため点滴・ルートを遮光。

血管確保用の生食と同時滴下で調整しながら投与すること。

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day 1 抗がん薬投与1時間半前にアプレピタントカプセル 125 mg 1C 内服

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| ① 生食 500 mLにて血管確保・ | 維持(20 mL/時間) |
| ② アタラックスP 25 mg + 生食 100 mL | 点滴静注30分(200 mL/時間) |
| ③ デキサメタゾン注 9.9 mg + 生食 50 mL | 点滴静注15分(200 mL/時間) |
| ④ グラニセトロン注 3mg + 生食 50 mL | 点滴静注30分(100 mL/時間) |
| ⑤ ダカルバジン + 5%ブドウ糖 500 mL | 点滴静注4時間(125 mL/時間) |
| ⑥ 強カネオミノファーゲンシー 40mL 1筒 + 生食 100 mL | 点滴静注60分(100 mL/時間) |
| ⑦ オランザピン 5 mg 1錠 1×夕 内服(※糖尿病患者は禁忌) | |

Day 2-3 アプレピタントカプセル 80 mg 1C 1×朝 内服

Day 2-4 オランザピン 5 mg 1錠 1×夕 内服(※糖尿病患者は禁忌)

デキサメタゾン 4 mg 2錠 2×朝昼 内服

DTIC療法

	コース	コース	コース	コース	コース
月 日	/	/	/	/	/
ダカルバジン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					