

DTIC 療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

DTIC 療法

4 週毎 5 コース予定

疾患名 悪性黒色腫

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

ダカルバジン(ダカルバジン) 1000 mg/m ²	day1 ↓
---------------------------------------	-----------

【注意】 * ダカルバジンは血管痛予防のため点滴・ルートも遮光。
血管確保用の生食と同時滴下で調整しながら施行。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1 抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル (125 mg) 1C を内服

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保 | 維持(20mL/時間) |
| ② アタラックス P 25 mg + 生食 100 mL | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |
| ③ デキサメタゾン注 9.9 mg(3mL) + 生食 50 mL | 点滴静注 15 分(200 mL/時間) |
| ④ グラニセトロン注 3mg 1 筒 + 生食 50 mL | 点滴静注 30 分(100 mL/時間) |
| ⑤ ダカルバジン + 5%糖液 500 mL | 点滴静注 4 時間(125 mL/時間) |
| ⑥ 強力ネオミノファーゲンシー 40mL 1 筒 + 生食 100 mL | 点滴静注 60 分(100 mL/時間) |

day 2, 3 アプレピタントカプセル (80 mg) 1C 1×朝 内服

day 2- 4 デキサメタゾン錠 8 mg 2×朝、昼 内服

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
ダカルバジン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					