

## PM 療法(有棘細胞癌)

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

## PM 療法(有棘細胞癌)

4 週毎 5 コース予定

疾患名 有棘細胞癌

主治医 指導医 HBs 抗原( + - ) HBc 抗体( + - ) HCV 抗体( + - )

## スケジュール

	day1	day2	day3	day4	day5	day6
ペブレオ(ペプロマイシン) 5 mg/day	↓	↓	↓	↓	↓	↓
マイトマイシン(マイトマイシン C)10 mg /day						↓

☆通常量より減量する際の理由☆

## (レジメン)

## Day 1, 2, 3, 4, 5

① ペブレオ 5 mg + 生食 3 mL 筋注

## Day 6

① 生食 500 mL で血管確保 維持 (20 mL/時間)

② ペブレオ 5 mg + 生食 3 mL 筋注

③ マイトマイシン 10 mg + 蒸留水 20 mL + 生食 50 mL 点滴静注 5 分(600 mL/時間)

	コース					
	day1	day2	day3	day4	day5	day6
月日	/	/	/	/	/	/
ペブレオ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
マイトマイシン 開始時刻						↓
確認						

## PM 療法(有棘細胞癌)

	コース					
	day1	day2	day3	day4	day5	day6
月日	/	/	/	/	/	/
ペブレオ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
マイトマイシン 開始時刻						↓
確認						

	コース					
	day1	day2	day3	day4	day5	day6
月日	/	/	/	/	/	/
ペブレオ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
マイトマイシン 開始時刻						↓
確認						

	コース					
	day1	day2	day3	day4	day5	day6
月日	/	/	/	/	/	/
ペブレオ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
マイトマイシン 開始時刻						↓
確認						

	コース					
	day1	day2	day3	day4	day5	day6
月日	/	/	/	/	/	/
ペブレオ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
マイトマイシン 開始時刻						↓
確認						