

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# Nivolumab+Ipilimumab 療法

3 週毎【1～4 回目】

疾患名 悪性黒色腫

主治医 指導医 HBs 抗原( ) HBs 抗体( ) HBc 抗体( ) HCV 抗体( )  
スケジュール

		day1
オプジーボ(ニボルマブ)	80 mg/body	↓
ヤーボイ(イピリムマブ)	3 mg/kg	↓

【注意】\*他剤使用時は、ニボルマブおよびイピリムマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること。

\*0.2 又は 0.22 μm インラインフィルターを通して投与すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

① 生食 250 mL で血管確保維持

② オプジーボ 80 mg + 生食 92 mL

点滴静注 30 分(200 mL/時間)

◎30 分間あけて

③ ヤーボイ + 生食 適量(全量 100 mL)

点滴静注 30 分

投与量が 100 mg 未満の場合は 1 mg/mL になるよう生食液量を調節する

400 mg 超過の場合は生食 250 mL に変更して全量 250 mL にする

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	コース	コース	コース	コース
月 日	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
ヤーボイ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確 認				