

5FU+CDDP+Pembrolizumab療法<<初日に4日分調製>>

③ パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 9.9 mg + アロカリス 235 mg + 生食 100 mL

点滴静注30分(200 mL/時間)

④ シスプラチン + 生食 300 mL 点滴静注120分(240 mL/時間)

*生食200 mLをバッグから前もって抜いておく

⑤ day 1 - day 5

フルオロウラシル + 生食 850 mL

側管より輸液ポンプにて点滴静注 約96時間(10 mL/時間)

⑥ 20 %マンニトール 300 mL 点滴静注30分(600 mL/時間)

⑦ ソルデム 3 A 500 mL 点滴静注240分(125 mL/時間)

⑧ ソルデム 3 A 500 mL 点滴静注240分(125 mL/時間)

◎必要時追加

day 2 - 4

① 生食 500 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)

② デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL 側管静注

	コース				コース			
	day 1	day 2	day 3	day 4	day 1	day 2	day 3	day 4
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
キイトルーダ 開始時間	↓				↓			
シスプラチン 開始時間	↓				↓			
フルオロウラシル 開始時間	→	→	→	→	→	→	→	→
確認								

	コース				コース			
	day 1	day 2	day 3	day 4	day 1	day 2	day 3	day 4
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
キイトルーダ 開始時間	↓				↓			
シスプラチン 開始時間	↓				↓			
フルオロウラシル 開始時間	→	→	→	→	→	→	→	→
確認								