

ID

氏名

年齢

科名

病棟

DOC+Trastuzumab
tri-weekly 療法3 週毎 コース予定疾患名 頭頸部癌(唾液腺癌)

主治医 指導医 HBs 抗原 () HBs 抗体 () HBc 抗体 () HCV 抗体 ()

スケジュール

		day1
ハーセプチン(トラスツズマブ)	初回投与:8 mg/kg 2 回目以降:6 mg/kg	↓
ドセタキセル	70 mg/m ²	↓

【注意】*トラスツズマブは投与予定日より1週間以内の遅れで投与する際は6 mg/kg を投与し、投与予定日より1週間を越えた際は、初回投与量の8 mg/kg を投与すること

*トラスツズマブ初回は90分以上かけて投与し、忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分まで短縮できる

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

<初回投与>

day 1

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ③ ハーセプチン + 生食 250 mL | 点滴静注 90 分 |
| ④ ドセタキセル + 5%ブドウ糖液 250 mL | 点滴静注 60 分(250 mL/時間) |

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

day 2, 3 デキサメタゾン錠 4 mg 内服

DOC+Trastuzumab tri-weekly 療法

<2回目以降>

day 1

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL 側管静注
- ③ ハーセプチン + 生食 250 mL 点滴静注 30~60 分
- ④ ドセタキセル + 5%ブドウ糖液 250 mL 点滴静注 60 分(250 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

day 2, 3 デキサメタゾン錠 4 mg 内服

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
ハーセプチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
ハーセプチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						