

Bevacizumab tri-weekly 療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

3 週毎 コース予定

疾患名 悪性神経膠腫

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

アバスチン(ベバシズマブ) 15 mg/kg	day1 ↓
------------------------	-----------

【注意】* ベバシズマブの点滴時間は初回投与時は 90 分かけて点滴静注、2 回目の投与は 60 分間で行って良い。それ以降は忍容性が良好であれば、30 分間投与でも良い。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② アバスチン + 生食 適量(全量 100mL) 点滴静注(90 分~30 分)
- ◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
アバスチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
アバスチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						